

برنام آگهی مجاہد آموزش

صبح جمعه
۱۴۰۱/۳/۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز ستjetن آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

مجموعه مامایی

دورس امتحانی و فرازیب مربوطه										رشته امتحانی
زبان عمومی	دایره کار	ویژگی های انسان	تغیراتی	پوست	عصب	روزگار	جذب	تنفس	درد	
۳	۰	۱	۱	۲	۲	۴	۰	۰	۰	مامایی
۳	۲	۰	۰	۲	۴	۳	۰	۰	۰	مشاوره در مامایی

تعداد سوالات: ۱۶۰

مشخصات داوطلب:

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی:

تعداد صفحات: ۲۲

شعاره کارت:

داوطلب عزیز
خواهشمند است فیل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تنداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مستولان جلسه اطلاع دهد.

۴- استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز نمی باشد.

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

- ۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد فاز اول لیبر صحیح است؟**
- (الف) کاهش آدنوزین منوففات حلقوی cAMP
 - (ب) افزایش میزان Ca^{2+} داخل سلولی
 - (ج) افزایش واکنش متقابل اکتین میوزین
 - (د) کاهش تحریک پذیری سلول‌های میومتر
- ۲ - کدامیک از موارد زیر نشانگر لیبر غیر طبیعی در یک زن نولی پار است؟**
- (الف) مرحله نهفته طولانی بیشتر از ۱۴ ساعت
 - (ب) طولانی شدن نزول کمتر از ۲ ساعتی متر در ساعت
 - (ج) توقف ثانویه دیلاتاسیون بیشتر از ۲ ساعت
 - (د) طولانی شدن دیلاتاسیون در مرحله فعال کمتر از ۱/۵ ساعتی متر در ساعت
- ۳ - جنبینی که دارای فقدان تغییر پذیری FHR خط پایه و افت‌های دیر هنگام یا متغیر راجع است، در کدامیک از گروه‌های زیر برای تفسیر ضربان قلب است؟**
- (الف) گروه I: طبیعی
 - (ب) گروه II: نامشخص
 - (ج) گروه III: غیرطبیعی
 - (د) الگوی سینوسی
- ۴ - کدامیک از موارد زیر در مورد القای لیبر صحیح است؟**
- (الف) در زنان دارای اسکار قبلى رحم از بروستاگلاندین برای آماده سازی سرویکس استفاده شود.
 - (ب) میزان بروز کوریوامینوتی در زنانی که آمنیوتومی می‌شوند، بیشتر نیست.
 - (ج) القا در همه وضعیت‌هایی که امکان لیبر خودبخود را منتفی می‌کند، کنتراندیکاسیون دارد.
 - (د) برای القای الکتیو در هنگام زایمان باید رضایت نامه رسمی گرفته شود.
- ۵ - کدامیک از موارد زیر در خصوص دیستوژنی شانه صحیح است؟**
- (الف) در اکثر موارد دیستوژنی شانه قابل پیشگیری است.
 - (ب) در مانور Rubin، با چرخاندن پیشرونده شانه خلفی به میزان ۱۸۰ درجه شانه قدامی آزاد می‌شود.
 - (ج) بر اساس نظر کالج متخصصین زنان ACOG زایمان سازارین الکتیو برای تمام زنان مشکوک به جنبین ماکروزوم اقدام مناسبی نیست.
 - (د) بر اساس نظر کالج متخصصین زنان ACOG برای آزاد سازی شانه **گیر افتاده** مانور WOODS برتر از مانورهای دیگر است.
- ۶ - کدامیک از موارد زیر در مورد اداره لیبر در زایمان برای صحیح است؟**
- (الف) مانور پراگ در صورت عدم چرخش بدن جنبین به سمت خلف به کار می‌رود.
 - (ب) مانور زاویتلی در موارد عدم چرخش پشت جنبین به سمت سمتیز به کار می‌رود.
 - (ج) فورسپس Piper در مواردی که نمی‌توان سمعیزیوتومی کرد، استفاده می‌شود.
 - (د) در مانور موربیسو انگشتان اشاره و میانی روی مائگزیلا برای کمک به فلکسیون سر قرار می‌گیرند.
- ۷ - کدامیک از موارد زیر در مورد تغییرات در دوران نفاس صحیح است؟**
- (الف) روگاهها بعد از ۲ هفته به اندازه قبل برجسته می‌شوند.
 - (ب) تعداد کلی میوسمیت‌ها کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.
 - (ج) پسرفت کامل جفت ۴ هفته به طول می‌انجامد.
 - (د) تاروز سوم بعد از زایمان از شدت دردها کاسته می‌شود.

۸ - کدامیک از موارد زیر در خصوص چسبندگی های غیر طبیعی جفت صحیح می باشد؟

(الف) یکی از علل نادر هیسترکتومی اورژانس هستند.

(ب) انجام غربالگری آلفاگلوبولوتین یکی از عوامل خطر محسوب نمی شود.

(ج) در سه ماهه دوم و سوم معمولاً خونریزی وجود دارد.

(د) با استجش بیشترین ضخامت آندومتر در سه ماهه اول بارداری، می توان آن را پیش بینی کرد.

۹ - برای اداره پارگی پیش از موعد و پره ترم پرده ها، در کدامیک از سنین حاملگی زیر پروفیلاکسی استریپتوک گروه

B توصیه نمی شود؟

(الف) ۳۴ هفته و بیشتر

(ب) ۳۲ هفته تا هفته ۲۲ کامل

(ج) ۲۴ هفته تا هفته ۲۱ کامل

(د) کمتر از ۲۴ هفته

۱۰ - بر اساس نظر کالج متخصصین زنان ACOG کدام مورد در خصوص لیبر پست ترم صحیح می باشد؟

(الف) ساکشن روتین حلق نوزاد هنگام زایمان را توصیه می کند.

(ب) حاملگی هایی که تا انتمام هفتی ۴۱ طول کشیده اند پست ترم می نامد.

(ج) آمنیوانفورمیون در جریان لیبر برای رقیق کردن مکونیوم از آسپیراسیون مکونیوم جلوگیری می کند.

(د) در مواردی که سن حاملگی قطعی نیست با استفاده از بهترین برآورد سن حاملگی، زایمان در هفته ۴۱ صورت گیرد.

۱۱ - برای اداره محدودیت رشد جنین در کدامیک از دوره های زیر کورتیکوستروئیدها برای بلوغ ریه جنین توصیه می شود؟

(الف) قبل از هفته ۲۴

(ب) ۲۴ تا ۳۴ هفته

(ج) ۳۴ هفته تا ۳۸ هفته

(د) ۳۸ تا ۴۰ هفته

۱۲ - کدامیک از موارد زیر در مکانیسم ایجاد دوقلویی منوکوریون منو آمنیون دخیل است؟

(الف) در بین روزهای ۸ و ۱۲ حفره آمنیون در بالای دیسک ژرمینال تشکیل می شود و تقسیم روبانی رخ می دهد.

(ب) در روزهای ۴ تا ۸ بعد از لفاح یک بلاستوسیست یا دو امپریو بلاست مجزا به وجود می آیند.

(ج) در روزهای صفر تا ۴ بعد از لفاح روبان به دو نیم تقسیم می شود.

(د) تقسیم ناکامل یک روبان به دو قسمت رخ می دهد.

۱۳ - کدامیک از موارد زیر در خصوص اولیگو هیدر آمنیوس صحیح است؟

(الف) تشخیص سونوگرافیک بر پایه شاخک مایع آمنیون کمتر از ۲ سانتی متر است.

(ب) تماس با داروهایی که سیستم رینین-آنژیوتانسین را تحریک می کند، دخیل است.

(ج) با میزان بیشتر ناهنجاری های جنینی همراه است.

(د) احتمال پره اکلامپسی در مادر افزایش نمی باید.

۱۴ - در دایلر رنگی خانم باردار نمای «حلقه آتش» دیده می شود. کدامیک از تشخیص های زیر محتمل است؟

(الف) سقط خودبخود

(ب) حاملگی اکتوپیک

(ج) مول هیدانیفرم

(د) سقط ناقص

- ۱۵ - کدامیک از موارد زیر برای تشخیص سقط زود هنگام صحیح است؟**
- (الف) سونوگرافی ترانس ابdominal به ترانس وازیانال ترجیح داده می شود.
 - (ب) سونوگرافی دابلر برای بررسی روبان طبیعی ابتدایی استفاده نمی شود.
 - (ج) از تصویر برداری M-mode برای سنجش ضربان قلب استفاده می شود.
 - (د) طول سری دمی زیر ۷ میلی متر است و ضربان قلب وجود ندارد.
- ۱۶ - کدامیک از موارد زیر در خصوص بلوغ زودرس نیاز به بررسی دارد؟**
- (الف) سن زیر ۶ سال و داشتن دو مورد رشد پستانها و بروز خونریزی قاعده‌گی
 - (ب) سن زیر ۶ سال و داشتن یکی از موارد رشد پستانها و یا رویش موهای پوبیس
 - (ج) سن زیر ۸ سال و داشتن دو مورد رشد پستانها و خونریزی قاعده‌گی
 - (د) سن زیر ۸ سال و داشتن یک مورد رشد پستانها و یا رویش موهای پوبیس
- ۱۷ - بر طبق تقسیم‌بندی STRAW، دوره زودرس بعد از یائسگی (Early post menopause +1a) شامل چه مرحله‌ای است؟**
- (الف) افزایش FSH، کاهش استرادیول و گذشتن ۱۲ ماه از آخرین قاعده‌گی
 - (ب) ثابت ماندن FSH، افزایش LH و شروع گرگرفتگی‌ها
 - (ج) کاهش گرگرفتگی‌ها، کاهش FSH، ثابت ماندن LH
 - (د) گذشتن ۴ تا ۵ سال از آخرین قاعده‌گی و کاهش گرگرفتگی‌ها
- ۱۸ - همه موارد ذیل از عوامل خطر پیدایش سرطان اندومتر باشد، بجز:**
- (الف) نولی‌بار
 - (ب) ناباروری
 - (ج) چاقی
 - (د) یائسگی زودرس
- ۱۹ - همه موارد زیر از تشخیص‌های افتراقی منارک زودرس ایزوله می‌باشد، بجز:**
- (الف) ترومما
 - (ب) سندروم مک کان - آلبراست
 - (ج) سوء استفاده جنسی
 - (د) هیپرتیروئیدی اوایله
- ۲۰ - کدامیک از موارد ذیل درباره خطر ابتلا به سرطان پستان صحیح می‌باشد؟**
- (الف) با افزایش سن زنان، خطر ابتلا آنان به سرطان پستان کاهش می‌باید.
 - (ب) هر چه دوران تولید مثل زنان طولانی‌تر باشد، خطر ابتلا به سرطان پستان کاهش می‌باید.
 - (ج) سابقه خانوادگی سرطان پستان، از عوامل خطر کاملاً شناخته شده ابتلا به سرطان است.
 - (د) یائسگی زودرس در زنان، باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان می‌شود.
-
- بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده**
- ۲۱ - چنانچه بخواهیم در یک مادر تک فرزند با تغییر نگوش، تقویت احساس کارایی فردی و نقش دیگران مهم، قصد او را در جهت فرزندآوری بیشتر، تقویت کنیم، با کاربست کدام تئوری اقدام به تغییر رفتار می‌کنیم؟**
- (الف) مدل اعتقاد بهداشتی
 - (ب) الگوی مراحل تغییر
 - (ج) نظریه یادگیری اجتماعی
 - (د) تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده



۲۲ - در الگوی برنامه ریزی پریسید-پروسید، ارزشیابی تأثیرات بلند مدت برنامه همانند تغییر در کینش زندگی و شاخص‌های بهداشتی کدام نوع ارزشیابی است؟
 (الف) ارزشیابی مرحله اجرا (ب) ارزشیابی فرایند (ج) ارزشیابی نتیجه (د) ارزشیابی تأثیر

۲۳ - در الگوی جامع آموزش بهداشت، تعیین اهداف ویژه عملیاتی، تدوین فعالیت‌ها، تعیین منابع و تدوین مراحل ارزشیابی در کدام مرحله صورت می‌گیرد?
 (الف) تعیین اهداف (ب) تعریف مشکلات (ج) طراحی برنامه (د) فعالیت‌های اجرایی

۲۴ - انجام مشاوره در قبل از آزمون جهت افزایش درک خطر، تعیین نتایج احتمالی آزمون و معرفی مراقبت‌های موجود، مستلزم استفاده از چه رویکرد مشاوره‌ای است؟

- (الف) دستوری (ب) غیر دستوری (ج) هم احساسی (د) همدردی

۲۵ - کدامیک از انواع مشاوره برای انجام مشاوره با هدف آموزش جنسی مناسب است?
 (الف) مشاوره تکاملی (ب) مشاوره پیشگیری (ج) مشاوره توانبخشی (د) مشاوره تسهیل‌گرانه

۲۶ - جهت مبارزه با کمبود روی در کودکان، رایج‌ترین حامل غذایی برای اضافه نمودن روی کدام است?
 (الف) گندم (ب) شکر (ج) آرد غلات (د) شیر خشک

۲۷ - جهت کمک به پیاده سازی سیاست‌های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مناسب‌ترین رویکرد آموزش بهداشت کدام است?
 (الف) رویکرد قانونی (ب) رویکرد خدمانی (ج) رویکرد آموزشی (د) رویکرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه

۲۸ - آموزش روش انجام خودآزمایی پستان بر روی ماکت به زنان مراجعه‌کننده جهت دریافت مراقبت‌های سلامت باروری به مراکز بهداشتی چه نام دارد?
 (الف) نقش بازی (Role playing)
 (ب) تماش عملی (Demonstration)
 (ج) تمرین شبیه سازی (Simulation practice)
 (د) آموزش برنامه ریزی شده (Programmed instruction)

۲۹ - بر اساس اهداف دستور کار توسعه پایدار S ، میزان مرگ و میر مادران در هر صد هزار تولد زنده در سال ۲۰۲۰ به چه میزان باید کاهش یابد?
 (الف) یک سوم میزان آن در سال ۲۰۱۵
 (ب) یک چهارم میزان آن در سال ۲۰۱۵
 (ج) کمتر از ۷۰
 (د) کمتر از ۵۰

۳۰ - کدامیک از انواع مطالعات زیر قدرت استنتاج علمی بالاتری دارد؟

- (الف) مقطعی (cross-sectional)
- (ب) مورد شاهدی (case-control)
- (ج) هم گروهی (cohort)
- (د) کار آزمایی بالینی (clinical trial)

۳۱ - غربالگری کانسر سرویکس در طبقات اجتماعی پایین جامعه چه نوع غربالگری است؟

- (الف) همگانی
- (ب) تجویزی
- (ج) انتخابی
- (د) چند مرحله‌ای

۳۲ - تکرار آموزش مکمل یاری با ویتامین در دختران دیپرستانی در فاصله های معین به منظور شناساندن بهتر این

برنامه، اشاره به کدام اصل آموزش بهداشت دارد؟

- (الف) ایجاد انگیزه (Motivation)
- (ب) تقویت (Reinforcement)
- (ج) بازخوراند (Feedback)
- (د) جامیعت (Comprehensiveness)

۳۳ - همه موارد زیر از اهداف برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد است، بجز:

- (الف) تأمین حقوق باروری برای همه زوجین
- (ب) ارتقا و پایش عهدنامه حقوق کودک
- (ج) کاهش نابرابری حقوق زن و مرد
- (د) بهبود وضعیت بهداشت باروری

۳۴ - در چهار چوب خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه ()، در برخورد با مشکل آنمی: مداخلاتی چون تغذیه

مناسب، آموزش بهداشت و کنترل ناقل (پارازیت) جزء کدام دسته از مداخلات می باشد؟

- (الف) ارتقایی
- (ب) پیشگیری
- (ج) درمانی
- (د) بازتوانی

۳۵ - طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، کدامیک از موارد زیر در مورد تغذیه شیرخوار با شیر مادر صحیح

نمی باشد؟

- (الف) طی هفته اول تولد، ۸-۱۰ بار شیردهی در ۲۴ کافی می باشد.
- (ب) طی هفته اول تولد، اگر کودک خودش در شب بیدار نشود، باید او را بعد از ۳ ساعت جهت شیردهی بیدار نمود.
- (ج) طی ۱ هفتگی تا ۶ ماهگی، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ کافی می باشد.
- (د) طی ۷-۸ ماهگی، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ کافی می باشد.

۳۶ - در کار آزمایی های با تعداد نمونه نسبتا کم، کدامیک از روش های تخصیص تصادفی نمونه ها در گروه های مورد مطالعه

معمول اما مناسب تر است؟

- (الف) ساده
- (ب) طبقه ای
- (ج) بلوک بندی
- (د) بلوک طبقه ای

۳۷ - بررسی حوادث نامطلوب ناشایع در کدام فاز از کار آزمایی های بالینی انجام می گیرد؟

- (الف) یک
- (ب) دو
- (ج) سه
- (د) چهار

۳۸- خانم ۱۸ ساله ای در هفته ۸ بارداری به مرکز مراجعه نموده که سه نوبت واکسن بنتاوالان و یک نوبت مسکن گانه در کودکی دریافت کرده است. تزریق واکسن دوگانه برای وی چگونه باید انجام گیرد؟

- (الف) اولین دوز در همین مراجعه، دوز بعدی یک سال بعد
- (ب) اولین دوز پس از پایان سه ماهگی، دوز بعدی یک ماه بعد
- (ج) اولین دوز در همین مراجعه، دوز بعدی یک ماه بعد
- (د) اولین دوز پس از پایان سه ماهگی، دوز بعدی یک سال بعد

۳۹- کودک متولد شده در ۹۶/۲/۱۸ و بدون سابقه قبلی واکسیناسیون، در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به مرکز جهت تزریق واکسن آورده شده است. در این مراجعه چه واکسن‌هایی به این کودک باید تزریق شود؟

- (الف) سه گانه، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، فلح اطفال تزریقی، MMR
- (ب) بنتاوالان، فلح اطفال خوراکی، فلح اطفال تزریقی، MMR
- (ج) سه گانه، هپاتیت ب، فلح اطفال خوراکی، MMR
- (د) بنتاوالان، فلح اطفال خوراکی، MMR

۴۰- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، وارنیش فلوراید برای کودک از چه زمانی و هر چند ماه یک بار لازم است انجام گیرد؟

- (الف) از دو سالگی، هر شش ماه
- (ب) از سه سالگی، هر شش ماه
- (ج) از دو سالگی، هر یک سال
- (د) از سه سالگی، هر یک سال

نوزادان و مراقبت‌های مربوطه

۴۱- کدام گزینه در مورد عفونت پری ناتال صحیح است؟

- (الف) عفونت در داخل رحم ایجاد می‌شود و به اعضای در حال تکامل آسیب می‌رساند.
- (ب) در هفته اول زندگی رخ می‌دهد، عموماً شامل ویروس‌های دوره پس از زایمان است.
- (ج) کسب عفونت حوالی زمان زایمان بوده و شامل باکتری‌ها و ویروس‌ها هستند.
- (د) حوالی ۱۵ روزگی رخ می‌دهد و باعث کاهش ایمنی و سدهای دفاعی نوزاد می‌شود.

۴۲- کدام گزینه عامل عفونت‌های ویروسی حین زایمان است؟

- (الف) آدنوویروس
- (ب) زیکاویروس
- (ج) سرخرچه
- (د) انفلوانزا

۴۳- در معاینه چشم نوزاد میکروسفال تازه متولد شده اسکار ماکولا و لکه‌های کوچک در شبکیه مشاهده شده است. محتمل‌ترین علت کدام است؟

- (الف) پارووویروس
- (ب) ویروس زیکا
- (ج) سوء تغذیه دوران بارداری
- (د) ترومای شدید مادر در دوران بارداری

۴۴- عامل موثر بر امتیاز آپکار منفی کاذب کدام است؟

- (الف) سولفات منیزیم
- (ب) نوروپاتی مادرزادی
- (ج) آنزی کوان
- (د) اسیدوز مادر

۴۵ - ضربان قلب نوزاد ۵ دقیقه پس از تولد، ۷۰ ضربه در دقیقه - تنفس نامنظم و آهسته - رنگ پریده - با ورود **کاتر بند** بینی عطسه می‌کند و اندام‌ها دارای فلکسیون است. نمره آپکار دقیقه ۵ نوزاد چقدر است و اقدامات بعدی کدام است؟

الف) ۷ - تا یک ساعت هر ۵ دقیقه امتیاز آپکار اندازه گیری می‌شود.

ب) ۵ - تا ۲۰ دقیقه هر ۵ دقیقه امتیاز آپکار کنترل می‌شود.

ج) ۷ - نیاز به بیکاری ندارد.

د) ۵ - احیای فوری نیاز است.

۴۶ - همه گزینه‌ها برای ترجیح نوزاد ۳۷ هفته با لیبر و زایمان بدون عارضه صحیح است، بجز:

الف) دفع یک بار مدفع

ب) تنفس ۶۸ بار در دقیقه

ج) حداقل دو بار تغذیه موقفيت‌آمیز و بدون عارضه

د) درجه حرارت زیر بغل $\frac{37}{4}^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد در گهواره باز

۴۷ - در کدام مورد نوزاد می‌تواند از شیر مادر تغذیه کند؟

الف) HIV درکشورهای توسعه یافته

ب) آبسه پستان به علت استافیلوکوک طلایی

ج) ویروس هرپس سیمپلکس به همراه وزیکول‌های پستانی

د) مادر و نوزاد در حال درمان به علت بیماری سیفلیس فعال

۴۸ - اثرات هیپرپاراتیروئیدی مادر بر نوزاد کدام است و با چه مکانیسمی رخ می‌دهد؟

الف) زایمان پره‌ترم - ناشناخته

ب) هیپرکلسیمی - پیشی گرفتن زنیبکی

ج) مرگ داخل رحمی جنین - کاهش PTH نوزاد

د) هیپرکلسیمی - ورود کلسیم مادر در خون جنین و سرکوب غده پاراتیروئید

۴۹ - علت اوروباتی انسدادی در نوزاد کدام است؟

الف) سندروم مثانه بزرگ - کولون کوچک - کاهش پریستالنیسم روده‌ای

ب) هیدروپورتر و نفروز دو طرفه

ج) اولگیوھیدروآمینوس

د) هیپوپلازی ربوی

۵۰ - کدام گزینه در مورد فتق مادرزادی دیافراگم صحیح است؟

الف) در مواردی که فتق خفیف است نیازی به درمان نیست.

ب) میزان رخ داد یک درصد هزار تولد زنده است.

ج) بزرگتر شدن ریه نوزاد از حد طبیعی از علامت آن است.

د) مهار رشد ریه جنین با ورود محتویات شکم به داخل حفره قفسه سینه اتفاق می‌افتد.

۵۱ - کدامیک از جملات زیر درخصوص پلتورا صحیح است؟

الف) در پلی‌سیتومی دیده می‌شود.

ب) در نوزادان پره‌ترم شایع است.

ج) ناشی از کم خونی است.

د) در نتیجه ضخیم شدن بوست اتفاق می‌افتد.

۵۲ - وجود مناطق نرم در ناحیه پس‌سری نوزاد ممکن است با کدام عارضه ذیل همراه باشد؟

- (الف) آپلازی مادرزادی پوست سر
- (ب) پلاکیوسفالی ناشی از تغییر شکل
- (ج) استوتزیاپیبروفکتا
- (د) تربیزومی ۱۳

۵۳ - در معاینه چشم نوزادی قطر قرنیه بیش از یک سانتی‌متر است و فوتوفوبی و اشک ریزش مشاهده می‌شود. کدام عارضه بیشتر مطرح است؟

- (الف) کاتاراکت
- (ب) کوریورتینت
- (ج) گلوکوم
- (د) رتینوپاتی نارس

۵۴ - کدامیک از جملات ذیل درخصوص معاینه دهان نوزاد صحیح است؟

- (الف) عدم ترشح فعال بzac نیاز به بررسی جدی دارد.
- (ب) کیست‌های احتیابی در عرض چند هفته خودبخود ناپدید می‌شود.
- (ج) مرواریدهای اپشتین نیاز فوری به مداخله پزشکی دارند.
- (د) نوزاد با فرنولوم کوتاه هرگز نمی‌تواند تنفسی موفق از شیر مادر داشته باشد.

۵۵ - در صورت تجویز اریترومایسین به نوزاد نارس کدام عارضه محتمل است، رخ دهد؟

- (الف) هیپوتانسیون
- (ب) ناشتوابی
- (ج) تنگی پلور
- (د) زردی

۵۶ - کدامیک از عوارض آسفکسی در نوزاد است؟

- (الف) هیپرگلبسمی
- (ب) هیپرکلسمی
- (ج) هیپرتانسیون ریوی
- (د) هیپرnatرمی

۵۷ - کدامیک از ویزگی‌های فلج ارب دوشن است؟

- (الف) آسیب در سطح مهره چهارم گردنی است.
- (ب) قدرت چنگ زدن همواره از دست می‌رود.
- (ج) رفلکس دو سر وجود دارد.
- (د) رفلکس مورو در سمت مبتلا دیده نمی‌شود.

۵۸ - در نوزاد مبتلا به دیسترنس تنفسی حاد در صورت طبیعی بودن ریه‌ها در رادیوگرافی قفسه سینه، کدامیک از موارد ذیل بیشتر مطرح است؟

- (الف) کم خونی
- (ب) فتق دیافراگم
- (ج) سندرم دیسترنس تنفسی
- (د) هیپوپلازی ریه

۵۹ - کدامیک از موارد ذیل احتمال سندرم دیسترنس تنفسی را در نوزاد افزایش می‌دهد؟

- (الف) هیپرتانسیون مژمن مادر
- (ب) مادر دیابتیک
- (ج) اعتیاد مادر به هروئین
- (د) پارگی طولانی مدت پرده‌ها

- ۶۰ - در نوزاد متولد شده از مادر دیابتک درخصوص سنجش گلوکز خون، کدام اقدام صحیح است؟
- اگر بدون علامت باشد نیاز به بررسی نیست.
 - بعد از تغذیه از شیر مادر طی ساعت اول و دوم زندگی باید انجام شود.
 - بلافاصله بعد از زایمان در همه نوزادان انجام شود.
 - در عرض ۳۰ دقیقه اول بعد از زایمان و قبل از تنفس با شیر مادر باید انجام شود.

جنین‌شناسی

- ۶۱ - در کدام ماه تکوین، اندازه سر جنین حدود یک سوم طول فرق سر-پاشنه پا می‌باشد؟
- ۹
 - ۷
 - ۵
 - ۳

- ۶۲ - کف حفره آمنیون اولیه توسط کدامیک از لایه‌های روانی تشکیل می‌شود؟

- (الف) Trophoblast
 (ب) Amnioblast
 (ج) Hypoblast
 (د) Epiblast

- ۶۳ - کدامیک از ساختارهای زیر از بقایای دستگاه مژونفروس در جنین مونث می‌باشد؟

- (الف) اپوفورون
 (ب) پاروفورون
 (ج) کبیست گارتنر
 (د) لوله‌های اپیزنتال

- ۶۴ - سلول زایایی که درون فولیکول ثانویه قرار دارد، چه نامیده می‌شود؟

- (الف) Ovum
 (ب) Oogonia
 (ج) Primary oocyte
 (د) Secondary oocyte

- ۶۵ - پرده کلوآکی در کدام هفتۀ تکوین جنینی پاره می‌شود؟

- ۹
- ۷
- ۵
- ۳

- ۶۶ - مجرای واژدفران توسط کدام ساختار روانی ایجاد می‌شود؟

- (الف) مجرای میزنای
 (ب) مجرای مژونفربیک
 (ج) مجرای آلتونیس
 (د) مجرای پارامژونفربیک

- ۶۷ - در دوران روانی هورمون آنتی مولرین A در چه جنسی و توسط کدام سلول ترشح می‌شود؟

- (الف) مذکر - لیدیگ
 (ب) مذکر - سرتولی
 (ج) مونث - فولیکولی
 (د) مونث - نکای داخلی

۶۸- فضای بین پرده‌های کوریونی جفت توسط چه عاملی اشغال می‌شود؟

- (الف) خون مادری
- (ب) خون جنینی
- (ج) مزودرم خارج روبانی
- (د) دسیدوای قاعده‌ای

۶۹- بخش اسکلروتوم سومایت‌ها کدام ساختار جنینی را ایجاد می‌نماید؟

- (الف) درم پوست
- (ب) ستون مهره‌ها
- (ج) عضلات محوری تن
- (د) استخوان اندام‌های حرکتی

۷۰- در یک مرد بارور سالم، بطور طبیعی تا چند درصد از اسپرم‌ها ممکن است دارای ناهنجاری باشند؟

- (د) سی
- (ج) بیست
- (ب) ده
- (الف) صفر

۷۱- اولین تقسیم میوزی گامت ماده چه زمانی کامل می‌شود؟

- (الف) ماه پنجم جنینی
- (ب) هنگام تخمک گذاری
- (ج) در زمان لفاح تخمک
- (د) هنگام تشکیل فولیکول اولیه

۷۲- کدام ورید جنینی حاوی خون اکسیژن‌دار است؟

- (الف) کاردینال
- (ب) آربیگوس

- (د) نافی
- (ج) زرددهای
- (ب) آربیگوس

۷۳- کدام ساختار رویانی در تشکیل درم پوست مشارکت نمی‌کند؟

- (الف) مزودرم صفحه جانبی
- (ب) سلول‌های ستیغ عصبی
- (ج) مزودرم بینایینی
- (د) مزودرم مجاور محوری

۷۴- استخوانی (بسته) شدن زودهنگام کدام ساختار جمجمه جنین موجب بروز اسکافوسفالی می‌شود؟

- (الف) ملاج قدامی
- (ب) ملاج خلفی
- (ج) درز کرونال
- (د) درز سازیتال

۷۵- در هنگام بازگشت فتق فیزیولوژیک، آخرین بخشی که به داخل حفره شکم بازمی‌گردد، کدام است؟

- (الف) کولون عرضی
- (ب) کولون سیگمویید
- (ج) سکوم
- (د) ززنوم

۷۶- مخجه از کدام قسمت لوله عصبی رویانی تکوین می‌یابد؟

- (الف) Metencephalon
- (ب) Prosencephalon
- (ج) Myelencephalon
- (د) Telencephalon

۷۷ - نفرون های کلیه دائمی انسان توسط کدام ساختار روانی ایجاد می شود؟

- (الف) لوله های مژونفروس
- (ب) بلاستمای متابفریک
- (ج) مجرای پارامژونفروس
- (د) انشعابات جوانه میزانی

۷۸ - در هنگام تولد، کدامیک از ساختارهای گردش خون نوزاد بسته نمی شود؟

- (د) سینوس کوروناری
- (ج) ورید نافی
- (ب) سوراخ بیضی
- (الف) شریان نافی

۷۹ - اگر طی فرآیند تکوین صورت، برآمدگی ماغزیلاری و برآمدگی بینی داخلی به یکدیگر جوش نخورند، کدام ناهنجاری مادرزادی ایجاد می شود؟

- (الف) شکاف مایل صورت
- (ب) لب شکری طرفی
- (ج) شکاف کام منفرد
- (د) لب شکری میانی

۸۰ - حدود چند درصد از زنان دارای حاملگی دوقلو، در نهایت دو نوزاد را به دنیا می آورند؟

- (د) ۶۰
- (ج) ۴۵
- (ب) ۳۰
- (الف) ۱۵

بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی

۸۱ - کدام گزینه درباره عود بیماری متیپل اسکلروزیز (S) صحیح است؟

- (الف) عود آن در بعد از زایمان کمتر است.
- (ب) میزان عود در دوره بارداری افزایش می یابد.
- (ج) شیردهی احتمال عود در بعد از زایمان را افزایش می دهد.
- (د) ایمنوگلوبولین وریدی در بعد از زایمان ، عود را کاهش می دهد.

۸۲ - کدام گزینه درباره وضعیت ید در بارداری صحیح است؟

- (الف) افزایش نیاز به ید جهت تولید هورمون تیروثئیدی
- (ب) افزایش بازجذب کلیوی ید در بارداری
- (ج) نیاز به مصرف ۲۹۰ میکروگرم بد روزانه
- (د) افزایش چشمگیر در نیاز جنین به ید در اوخر بارداری

۸۳ - کدام مراقبت، از زنان مبتلا به دیابت آشکار بارداری توصیه نمی شود؟

- (الف) اکوکاردیوگرافی جنین در سه ماهه دوم
- (ب) پایش دوره ای و منظم سلامت جنین در سه ماهه سوم
- (ج) بستری مادر از هفته ۳۴ بارداری
- (د) قطع انسولین از ابتدای شروع لیبر



۸۴ - کدام گزینه درباره مراقبت، اختلالات همانولوژیک در بارداری صحیح است؟

(الف) تجویز ۴ میلی گرم اسید فولیک روزانه به زنان آنمی داسی شکل

(ب) حفظ همانوکریت بالای ۲۵ با تزریق خون به زنان آنمی داسی شکل

(ج) تزریق ایمنو گلوبولین وریدی در زنان با پلاکت کمتر از صدهزار

(د) حفظ همو گلوبولین مادر تالاسمی مازور بالای ۱۱ میلی گرم در دسی لیتر

۸۵ - در همه موارد، تجویز دوز بالای اسید فولیک به مادر ضروری است، بجز:

(الف) سابقه مرگ داخل رحمی جنین

(ب) بیماری کرون

(ج) سابقه نوزاد با نقص لوله عصبی

(د) سابقه فامیلی بیماری مادرزادی قلب

۸۶ - همو گلوبولین خانم باردار ۲۶ هفته، با سابقه خونریزی مکرر به دلیل جفت سرراهی ۷ میلی گرم در دسی لیتر بوده و وضعیت همودینامیک و بالینی پایداری دارد. چه توصیه ای برای درمان آنمی وی دارید؟

(الف) تزریق خون کامل تا رسیدن به همانوکریت ۲۰

(ب) تزریق یک سل تا رسیدن به همانوکریت ۳۰

(ج) تزریق آهن وریدی

(د) تجویز آهن خوراکی

۸۷ - کدام گزینه درباره سنگ مجاري ادراری در بارداری صحیح است؟

(الف) اغلب باعث انسداد مجاري ادرار می شوند.

(ب) بطور شایع با هماجوری آشکار ظاهر می بایند.

(ج) در پبلونفریت پایدار احتمال انسداد ناشی از سنگ مطرح است.

(د) کاربرد سنگ شکن از طریق پوست در بارداری توصیه می شود.

۸۸ - در خانم باردار مبتلا به بیماری مزمن کلیه کدام توصیه تا نیمه دوم بارداری انجام می شود؟

(الف) کاهش زمان دیالیز در مادر در حال درمان

(ب) انجام ملاقات هفتاهی یک بار تا نیمه دوم بارداری

(ج) اندازه گیری فشارخون - پروتئین و باکتریوری هر دو هفته یک بار

(د) کاهش زمان دیالیز مادر در موارد طبیعی بودن فشار خون

۸۹ - کدامیک از جملات زیر درخصوص آسم در بارداری صحیح است؟

(الف) در نیمی از مادران بیماری تشید می شود.

(ب) با افزایش پره اکلامپسی همراه است.

(ج) در حمله آسم جنین دچار هبیوکسی نمی شود.

(د) تائیر بر مرگ و میر پری ناتال ندارد.

۹۰ - در خانم آنمیک با رتیکولوسیت کمتر از $\% 3$. m کمتر از ۸۰ کدام اقدام لازم است؟


(الف) اندازه گیری فربین سرم

(ب) درمان آنمی فقر آهن

(ج) الکتروفورز همو گلوبولین

(د) مشاوره با همانولوژیست

- ۹۱ - کدامیک از مشخصات سپسیس اولیه در زن باردار ترم است؟
- (الف) افزایش بروند قلبی و کاهش مقاومت عروقی
 - (ب) کاهش بروند قلبی و مقاومت عروقی
 - (ج) افزایش بروند قلبی و مقاومت عروقی
 - (د) کاهش بروند قلبی و افزایش مقاومت عروقی
- ۹۲ - خانم بارداری در اواسط بارداری دچار زردی گردیده است. بیلی رویین ۱۰ m هماتوکریت افزایش یافته، پلاکت کاهش و زمان پرتورومیکن افزایش پیدا کرده است. کدام تشخیص متحمل تر است؟
- (الف) کلستاز
 - (ب) کبد چرب
 - (ج) هپاتیت
 - (د) تومر کبدی
- ۹۳ - در خانم مبتلا به باکتریوری بدون علامت در صورت شکست درمان، کدام درمان ضد میکروبی توصیه می‌شود؟
- (الف) آموکسیسیلین، ۵۰۰ mg سه بار در روز تا سه روز
 - (ب) نیتروفورانتونین، ۱۰۰ mg چهار بار در روز تا ۲۱ روز
 - (ج) سفالوسپورین، ۲۵۰ mg چهار بار در روز تا سه روز
 - (د) سولفامتوکسازول، ۱۶۰ mg دو بار در روز تا ۲۱ روز
- ۹۴ - مقادیر آستانه غلظت گلوکز پلاسمای برای تشخیص دیابت بارداری یک ساعت پس از دریافت ۷۵ میلی گرم گلوکز خوراکی چند میلی گرم در دسی لیتر است؟
- (الف) ۹۲
 - (ب) ۱۸۰
 - (ج) ۱۹۰
 - (د) ۱۹۵
- ۹۵ - در صورت شک بر ترمبوز وریدی عمقی در زن باردار اولین اقدام چیست؟
- (الف) سونوگرافی فشاری پروگزیمال
 - (ب) سی تی اسکن
 - (ج) تصویربرداری رزونانس مغناطیسی
 - (د) تست حساس دی دایمر
- ۹۶ - خانم باردار با تشخیص هیدروپیس جنینی غیرایمیون مراجعته کرده است. اولین اقدام جهت ارزیابی و اداره عفونت، کدام است؟
- (الف) تست سرولوژیک مادر
 - (ب) سونوگرافی
 - (ج) کوردوستنر
 - (د) ترانسفوزیون داخل رحمی
- ۹۷ - خانم باردار در ۳۴ هفتگی با پارگی کیسه آب مراجعته کرده است. در صورت منفی بودن کشت استرپتوکوک گروه کدام اقدام براساس توصیه صحیح است؟
- (الف) انجام کشت مجدد از وازن و رکتوم و درمان ضد میکروبی وریدی
 - (ب) تجویز داروهای ضد میکروبی وریدی به مدت ۴۸ ساعت
 - (ج) تجویز داروهای ضد میکروبی وریدی به مدت ۷۲ ساعت
 - (د) تکرار کشت از وازن و رکتوم در صورت عدم زایمان تا ۲۵-۲۷ هفته بارداری
- ۹۸ - در خانم باردار مبتلا به میگرن کدام دارو منع مصرف دارد؟
- (الف) ارگوتامین
 - (ب) آمی تریپتین
 - (ج) آنتولول
 - (د) پرومتنازین



۹۹ - کدام جمله در خانم باردار مبتلا به صرع صحیح است؟

- الف) تداوم درمان در بارداری ضرورتی ندارد.
- ب) مراقبت بارداری لازم است هر دو هفته یک بار انجام شود.
- ج) احتمال ناهنجاری افزایش نمی‌بلد.
- د) در صورت بروز حمله صرع درمان مانند زمان غیر بارداری است.

۱۰۰ - مصرف کدام یک از داروهای زیر برای کنترل هیپرتانسیون در دوران حاملگی توصیه نمی‌شود؟

- الف) دبورتیک‌ها
- ب) عوامل مهارکننده گیرنده آدرنرژیک
- ج) ولزودیلاتورها
- د) مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنزیوتانسین

روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

۱۰۱ - بالینگر، براساس «روان درمانی مبتنی بر رشد» ارزیابی کدام بخش را آغاز می‌کند؟

- الف) ادراک
- ب) بینش
- ج) ایتو
- د) هیجان

۱۰۲ - کدام سبک دلبستگی نایمن، احتمال بروز اختلال شخصیت شدید و تجزیه‌ای را در بزرگسالی افزایش می‌دهد؟

- الف) آشفته
- ب) اجتنابی
- ج) دوسوگرا
- د) اضطرابی

۱۰۳ - از دیدگاه پیاره، در چه مرحله‌ای از رشد شناختی «توانایی بازنمایی کارکرد شی با دیدن آن»، شروع می‌شود؟

- الف) عملیات عینی
- ب) پیش عملیاتی
- ج) حسی - حرکتی
- د) عملیات صوری

۱۰۴ - مطابق قانون اثر در یادگیری، «هنگامی که یک کنش، مانع بروز یک رویداد منفی شود»، چه نامیده می‌شود؟

- الف) اجتناب گریز
- ب) تقویت منفی
- ج) یادگیری پاداش
- د) تقویت مثبت

۱۰۵ - پیامد رفتار احترام آمیز مصاحبه‌گر با بیمار، منجر به کدام موفقیت در پایان جلسه مصاحبه اولیه می‌شود؟

- الف) عینیت در رابطه درمانی
- ب) کاهش اضطراب بیمار
- ج) حفظ رازداری
- د) درمان بیمار - محور

۱۰۶ - در رویکرد مصاحبه شخص مدار، توجه بالینگر بر کدام جنبه‌های مراجع است؟


- الف) نقصان
- ب) خودآگاه ناخودآگاه
- ج) نقصان / قوت
- د) ناخودآگاه



سال ۱۴۰۱

مجموعه مامایی

آزمون کارشناسی ارشد

۱۰۷ - خانم بارداری گزارش می کند که در طی دو هفته گذشته، برای چند بار، بطور ناگهانی حملات تپش  خلبانی داشته که در طی چند دقیقه رو به افزایش رفته است. او همچنین، دارای علائم دیگری مثل تعریق تنفسی نیست. احساس ترس از مرگ نیز بوده است، احتمال کدام اختلال روانپزشکی برای وی مطرح است؟

- (الف) استرس پس از سانجه
- (ب) وحشت زدگی
- (ج) هراس ساده
- (د) اضطراب فراگیر

۱۰۸ - کدام گزینه معادل «معاینه جسمانی در طب» در حوزه روانپزشکی است؟

- (الف) مرور دستگاه ها
- (ب) معاینه وضعیت روانی
- (ج) اخذ تاریخچه روانی
- (د) مصاحبه روانپزشکی

۱۰۹ - کودکی در مصاحبه دارای علائم الگوهای فعالیت های قلبی و تکرار رفتار و گفتار، توانایی تکلیم پایین، و فقدان تعامل اجتماعی است. کدام اختلال برای وی محتمل است؟

- (الف) کم توان ذهنی
- (ب) درخودماندگی
- (ج) کم توجهی/بیش فعالی
- (د) یادگیری

۱۱۰ - خانم بارداری از بی خوابی، کاهش لذت جنسی و دچار افت انرژی شکایت می کند. او اشاره می کند از سه سال پیش بعد از سقط جنین، این علائم را داشته و با بارداری تشدید یافته است. احتمال کدام نوع اختلال افسردگی روانپزشکی برای وی مطرح است؟

- (الف) افسردگی اساسی
- (ب) افسردگی ناشی از بیماری طبی
- (ج) افسرده خوبی
- (د) کوتزنطیمی خلقی ایدزایی

۱۱۱ - از نظر فروید، سلامت روان، توانایی فرد در عملکرد مناسب کدام حوزه ها است؟

- (الف) من و فرمان
- (ب) کار و عشق
- (ج) رفاقت و صمیمیت
- (د) فعالیت جنسی و محبت

۱۱۲ - «تخیلات جنسی و میل به آمیزش قبل از مرحله تحریک» به کدام مرحله از پاسخ جنسی زن اشاره دارد؟

- (الف) میل
- (ب) ارگاسم
- (ج) فرونشیمی
- (د) انگیختگی

سال ۱۴۰۱

مجموعه مامایی

آزمون کارشناسی ارشد

۱۱۳ - خانمی با نوزاد ۲۳ روزه، بیان می کند که از روز پنجم پس از زایمان، احساس غمگینی اش شروع شده است. او ارزی کمی برای مراقبت از نوزاد دارد و گهگاهی گریه دارد. تشخیص احتمالی و اقدام مناسب یک ماما چیست؟

- (الف) افسردگی پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان
- (ب) سایکوز پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان
- (ج) آندوه بچه - ارجاع به متخصص روان
- (د) آندوه بچه - ویزیت مجدد هفته بعدی

۱۱۴ - دختر ۲۴ ساله ای شکایت دارد که چند روز قبل از شروع قاعده ای از علامت پرخوابی، نوسانات خلقی و حساسیت پستانها رنج می برد. کدام تشخیص محتمل تر است؟

- (الف) افسردگی خوبی
- (ب) سندروم پیش از قاعده
- (ج) اختلال ملال پیش از قاعده
- (د) دوقطبی

۱۱۵ - «برانگیختگی شدید و راجعه بر اثر رنج روانی و جسمانی فرد دیگر» مربوط به کدام نوع پارافیلیا است؟

- (الف) آزارخواهی جنسی
- (ب) تمثیلگری جنسی
- (ج) مبدل پوشی
- (د) آزارگری جنسی

۱۱۶ - خانمی یائمه ۵۲ ساله با مشکلات جنسی به شما مراجعه کرده است. طبق مدل SS T آموزش در مورد آناتومی و فیزیولوژی در دوران یائمه کی مرحله چند محسوب می شود؟

- (الف) اول
- (ب) دوم
- (ج) سوم
- (د) چهارم

۱۱۷ - کدامیک از موارد ذیل میل جنسی را افزایش می دهد؟

- (الف) پروژسترون
- (ب) دوپامین
- (ج) پرولاکتین
- (د) سروتونین

۱۱۸ - کدامیک از موارد ذیل قوی ترین ارتباط با عملکرد جنسی زنان را دارد؟

- (الف) سن
- (ب) خلق
- (ج) سلامت ذهنی
- (د) تحصیلات

۱۱۹ - هویت جنسی معمولا در چند سالگی شکل می گیرد؟

- (الف) ۲ تا ۳
- (ب) ۳ تا ۴
- (ج) ۴ تا ۵
- (د) ۷ تا ۶

۱۲۰ - موارد ذیل در مورد ارگاسم در زنان صحیح می باشد، بجز:

- (الف) ارگاسم های ناشی از تحریک کلیتوریس و تحریک واژنال از لحاظ فیزیولوژیک با هم برابرند.
- (ب) اختلال ارگاسم سراسر عمر زمانی هست که زن هیچ گاه به ارگاسم دست نیافته باشد.
- (ج) استعداد ارگاسمی زنان در سنین بالای ۳۵ سال کاهش می یابد.
- (د) عوامل روانی زیادی در اختلال ارگاسمی زنان دخالت دارند.

زبان عمومی

part one o a ular

re gions complete t e ollo n senten es y oos n t e estans er

1.1 - When one is frustrated on aname after the comm ttee e s on le to the unemployment of nurses

- a) distention b) discontent c) appraisal d) approval

1. - A diet containingleels of saturated fats can lead to

- a) famine b) slimness c) obesity d) fitness

1. - The mark of a genius is the willingness to explore all the, not just the most likely solution

- a) alternatives b) drawbacks c) generations d) disturbances

1. - Creative thinking requires an attitude that allows you to search for ideas andyour no longer an entrepreneur

- a) terminate b) neutralize c) manipulate d) undermine

1. - If you think creatively, you will find out new ways toyour objectives more effectively.

- a) abolish b) constrain c) constrict d) fulfill

1. - The transplantation of body organs needs theof the dead patient's guardians.

- a) dissent b) consent c) revival d) denial of

1. - Anesthetization to the story of a rare disease in the family usually so that the members of the family weresuch diseases.

- a) predisposed to b) extended to c) precipitated by d) extradited by

1. - The doctor ordered a chest ray since the respiratory symptoms were notto reach a proper diagnosis

- a) deficient b) fictitious c) sufficient d) ambitious

1. - WHO and other health organizations are trying hard tothe COVID 19 disease still causes fatalities

- a) accelerate b) aggregate c) potentiate d) eradicate

- 1 – People in societies benefit from care facilities while those manally at a are depraved substances.**
- a) affluent b) cultivated c) indigent d) debilitated
- 1 1 – Types of people are more infectious diseases than the physically robust.**
- a) suspicious about b) amenable to c) enthusiastic about d) resistant to
- 1 – Tension tends to mass a nation like ours soon after its onset.**
- a) resist b) reside c) subside d) persist
- 1 – Contact lenses sometimes give better visual to those nearsighted.**
- a) blurredness b) acuity c) infirmity d) restriction
- 1 – With of each semester, students take new courses to attend classes.**
- a) adherence b) disturbance c) disruption d) commencement
- 1 – The weather in big cities is filled with causing numerous health problems.**
- a) detergents b) disinfectants c) contaminants d) contractors
- 1 – Use on a recent study forty percent of the offices in the city to noisy areas.**
- a) viable b) vacant c) occupied d) preserved
- 1 – The old hospital was and a modern one with new equipment was built as a replacement.**
- a) deployed b) detained c) drenched d) demolished
- 1 – A terrible of sneezing some serious allergic reactions resulted in in her throat and blocked her breathing.**
- a) obstruction b) ingestion c) suspension d) maturation
- 1 – While still at the post office vaccination is clearly by its life saving values.**
- a) resumed b) compensated c) manipulated d) intervened
- 1 – Small swellings or lumps are rather than a unpleasant smell.**
- a) malodorous b) malformed c) vigilant d) vigorous

**Part 6 Reading comprehension**

Questions related to the passage are usually based on the passage's overall message. Complete the questions to test your understanding of the passage. Some questions may require you to use information from more than one part of the passage.

Passage 1

Urgently needed for addressing the energy question is a national energy plan, not only to address future energy needs, but also to avoid repeating the errors of the past. Subsidies to the airlines, for example, have encouraged the growth of less efficient forms of transportation; lack of support of the railroad industry has discouraged the use of rail transportation. Federal support for the development of a nationwide highway system, though making road travel far safer, has led to greater use of cars, with accompanying increases in the consumption of gasoline. Another example was the shift by the railroads, immediately before and after World War II from coal-fired steam locomotives to diesel-electric units. The Clean Air Act of 1970 also encouraged the consumption of fuels that are in limited supply, by causing industrial and power plant operators to switch from coal to natural gas and oil to meet air pollution standards. Nor has the government done anything to require changes in the rate structures for natural gas and electricity, which promoted higher consumption by offering a large number of users a lower price per unit.

1.1 – According to the text, a sound national energy plan will

- a) help increase airlines' subsidies and make road travel safer
- b) contribute to the growth of less efficient forms of transportation
- c) assist in meeting energy needs
- d) result in repeating errors of the past

1.2 – This passage mainly

- a) discusses the existing problems with saving energy
- b) deals with air pollution problem and concerns
- c) focuses on advantages of the fossil fuel and gas in human life
- d) warns against the use of the existing transportation means

1.3 – The or _____ sentence refers to

- a) what the government has done to preserve energy
- b) lack of change in the gas and electricity rate structure
- c) the decline in the consumption of gas and electricity
- d) the users' observance of air pollution standards

1.4 – According to the passage, the development of a nationwide highway system has

- a) increased road accidents with dramatic effects
- b) caused less fuel consumption and higher speed
- c) encouraged more and more use of private cars
- d) reduced the subsidies to the airlines and railroad industry

1.5 – Test to natural gas as an use of diesel electric units as an alternative to the government are

- a) mentioned as examples of appropriate planning for future energy needs
- b) criticized by the writer as they fail to address the future energy needs
- c) the ways the writer believes to be supported so that past errors are avoided
- d) the ways the government is supporting to increase its national income



Today, the level of healthcare has improved a lot. Presently, the goal of health care is to have a continuum of care for the patient; one which is integrated at all levels. Many hospitals offer a referral service or discharge plan to patients who are being discharged. Plans for the patients are discussed with a discharge planner, a person who is trained in assessing what the patients' requirements for healthcare will be after discharge from the hospital. Ts enables the patients to continue their care at a level which is most appropriate for them. Items reviewed for discharge planning include but are not limited to therapies, medication needs, living arrangements and identification of specific goals. A few of the options that are available for persons being discharged from an acute care hospital can include home health care, assisted living facilities, long-term care or hospice. Among numerous care facilities, home health care is one of the fastest growing segments of the healthcare industry. Alternatives for home care can meet both the medical and non-medical needs of a patient. Tes ers are provided to patients and their families at home or place of residence. Home care is a method of delivering nursing care and other therapies as required by the patient's needs.

1 – Teman eat epass es to ealt are ser es

- a) highlight the improvements of
- b) compare the present and past
- c) challenge the achievements of
- d) introduce the obstacles affecting

1 – Re erral ser es or s ar e plans to pat ents

- a) were already common in traditional medicine
- b) are to be removed to reduce treatment costs
- c) are recent developments in healthcare
- d) were rooted in health assessment policies

1 – The underlined word "Ts" refers to

- a) a post-recovery discharge from the hospital
- b) assessing the patients' post-discharge needs
- c) a trained person's ability to assess the needs
- d) a discharge planner's healthcare assessment

1 – ome ealt are ass ste l n a ltes lon term are or osp e are pat ents
s ar e rom a u te are osp tals

- a) no longer available for
- b) among the follow-up care services for
- c) proved to be largely inappropriate for
- d) not necessary for

1 – The underlined phrase "Tes ers" refers to

- a) care facilities
- b) growing segments
- c) medical and non-medical needs
- d) alternatives for home care



A developmental disability is defined as severe chronic disability that is attributable to a mental or physical impairment or combination of mental and physical impairments. Individuals with developmental disabilities were generally housed in institutions for the first half of the 20th century. Little attention was paid to their education, or medicinal or nutritional care. In 1963, The Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights was passed. Through this Act, federal funds supported the development and operation of state councils, protection and advocacy systems, university centers, and projects of national significance. This act provided the structure to assist people with developmental disabilities to pursue meaningful and productive lives. The institutions that housed these individuals gradually were closed or reduced in size. By 1975 these individuals were cared for at home, in schools or in small residential facilities. In 1975, Public Law (PL) 94-142 was passed, opening public schools to children with developmental disabilities. In 1985, PL 99-487 (102-119 in 1992), The Early Intervention Act, was passed, bringing services to children from birth to school age.

11 - In the early 1960s there were for the first allocation of funds to support developmental disabilities.

- a) provided with limited education
- b) offered proper medical or nutritional care
- c) mostly denied of being housed in institutions
- d) eager to attend the education arranged for them

1 - The year 1963 was for passing the "Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights".

- a) should be notorious
- b) is ethically disapproved
- c) is right to be condemned
- d) deserves special appreciation

1 - The spatial approach to support national developmental disabilities

- a) was a common happening long before the first half of the 20th century
- b) caused successful elimination of the causes of developmental disabilities
- c) followed the passing of the Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights
- d) proved ineffective despite the huge effort made to pass the law and allocate the funds

1 - The institutions that housed developmental disabilities

- a) continued offering care to all in need
- b) gradually became fewer and smaller
- c) failed to meet their intended goals prior to 1963
- d) set up new branches in rural areas following 1963

1 - Peninsular tools to train the developmental disabilities the developmental disabilities Assistance and Rights

- a) proved to be redundant following
- b) happened nearly a decade after
- c) well coincides with
- d) well preceded



Deep Learning in medicine is one of the most rapidly and new developing fields of science which has recently gathered momentum. Currently, almost every device intended for medical imaging has a more or less extended image and signal analysis and processing module which can use deep learning. It provides quantitative data necessary to make a diagnosis. The obtained quantitative features must be independent of the inter-subject variability and the type of medical device and, above all, must allow for reproducible results in the presence of high noise. The proposed deep learning algorithm should also ensure the independence of the results obtained by the operator of the imaging device and, to be more exact, ts position relative to the patient or the parameter settings in the device. In addition, the proposed deep learning algorithms must be tailored for the diagnosis of a specific disease entity. On the other hand, they must allow for reproducible results for high inter-subject variability. These criteria make it difficult to propose a methodology for the deep learning algorithms.

1 - eep earn n n me ne

- a) has a long history
- b) has witnessed a sharp decline
- c) is experiencing a speedy growth
- d) is falling behind other fields of science

1 - early all me al ma n e es

- a) prove incompatible with deep learning
- b) simplify deep learning analysis
- c) are independent of deep learning
- d) deploy deep learning

1 - W o t e ollo n s T true a out eep learn n

- a) The diagnostic data are mostly qualitative.
- b) Its obtained features are device independent.
- c) Its obtained features must be subject-dependent.
- d) The results must be reproducible.

1 - What does the underlined word "ts" refer to?

- a) The operator
- b) The patient
- c) The deep learning algorithm
- d) The imaging device

1 - The writer a met o olo y or t e eep learn n al or t ms

- a) criticizes criteria set to propose
- b) already seems determined to propose
- c) views as impossible proposing
- d) describes as challenging proposing



بسمه تعالیٰ

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد. تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رسانند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ از طریق سایت اینترنتی san.es.p.r.t اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۴ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- ❖ فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ❖ از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برج و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:		
نام رشته:	نام درس:	شماره سوال:	نوع دفترچه:	
نام منبع معتبر:	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد بررسی:

- بین از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.

توضیحات