

عصر پنجمین

۱۴۰۱/۳/۵

بنام آنکه جان را گرفت آموزت

وراست بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت امور انسانی

دفترچه شورای امورش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز متخصص آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه پرستاری

دورس امتحانی و ضرایب مریوظه							رشته امتحانی
دانشجویی	دانشجویی	دانشجویی	دانشجویی	دانشجویی	دانشجویی	دانشجویی	
۲	۴	۲	۲	۲	۲	۲	روان پرستاری
۲	۲	۲	۲	۲	۴	۴	پرستاری داخلی - جراحی
۲	۲	۴	۲	۲	۲	۲	پرستاری سلامت جامعه
۲	۲	۲	۲	۴	۲	۲	پرستاری کودکان
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	پرستاری نظامی
۲	۱	۲	۳	۳	۳	۳	پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	پرستاری توانبخشی
۲	۲	۲	۲	۲	۴	۴	پرستاری اورژانس
۲	۲	۲	۲	۲	۴	۴	پرستاری مراقبت های ویژه
۲	۲	۳	۱	۱	۴	۴	پرستاری سالمندی
۲	۲	۲	۱	۲	۲	۲	مدبربریت پرستاری

مشخصات داوطلب:

نام و نام خانوادگی:

شماره کارت:

تعداد سوالات:

زمان پاسخگویی:

تعداد صفحات:

۱۶۰

۱۶۰ دقیقه

۲۲


داوطلب عزیز

حواله شده است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دفت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهد.

* استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز نمی باشد.

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

مجموعه پرستاری



www.sanapezeshki.com



medical_sana

داخلی - جراحی

۱- خانم ۴۰ ساله با سابقه عفونت پبلونفریت مزمن، با درد شدید پهلو که به کشاله ران و کف پوینه تیر می‌کشد. همراه تهوع و استفراغ به اوزانس مراجعه کرده است. در بررسی به عمل آمده برای وی سنگ کلیه تشخیص داده شد. به منظور کنترل درد در مددجویی فوق چه اقدامی صحیح‌تر است؟

- (الف) استفاده از تکنیک‌های غیر دارویی کنترل درد
- (ب) تزریق داروی شل‌کننده عضلانی
- (ج) مصرف ضد التهاب غیر استروئیدی خوارکی
- (د) مصرف مخدوهای تزریقی

۲- در بررسی وضعیت تغذیه‌ای بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو با تغذیه دهانی، پرستار متوجه می‌شود که بیمار هنوز اسهال دارد و نسبت به چند روز قبل دچار کاهش وزن شده و تعادل منفی نیتروژن مطرح است. کدام مورد به منظور حمایت تغذیه‌ای صحیح است؟

- (الف) تغذیه لوله‌ای بینی-معدی
- (ب) تغذیه لوله‌ای بینی-رُزِنوم
- (ج) تغذیه کامل وریدی
- (د) گاستروستومی

۳- آقای ۶۰ ساله با سابقه هپاتیت سی و سیروز کبدی پیشرفت‌های همراه با آسیت سرکش و تنگی نفس در بخش بستره می‌باشد. مهم‌ترین مراقبت پرستاری کدام است؟

- (الف) بررسی آنزیمهای کبدی
- (ب) رژیم پرپروتئین و سدیم
- (ج) استراحت در تخت و عدم فعالیت
- (د) مصرف مایعات فراوان

۴- بیمار مبتلا به میاستنی گراو دچار ضعف عضلاتی شده است و پزشک معالج انجام تست آدروفونیوم (تنسیلون) را تجویز نموده است. پس از تزریق، ضعف عضلاتی بیمار شدیدتر شده است. پرستار نتیجه آزمون را چگونه تفسیر می‌نماید؟

- (الف) طبیعی
- (ب) مثبت
- (ج) بحران میاستنی گراو
- (د) بحران کولینرژیک

۵- فشار داخل جمجمه بیمار تحت مانیتورینگ، ۱۲ میلی‌متر جیوه است. از نظر پرستار تفسیر این سطح از فشار چیست؟

- (الف) تعادل طبیعی بین بافت مغز، خون و مایع CSF
- (ب) اختلال در تولید مایع مغزی نخاعی
- (ج) اختلال در کنترل خودکار فشار داخل جمجمه
- (د) کاهش شدید فشار شرب مغزی

۶- بعد از جایگذاری موفقیت‌آمیز بالن پمپ داخل آنورت در بیمار با شوک کاردیوژنیک، کدام تغییرات همودینامیک ایجاد می‌شود؟

- (الف) کاهش SVR و کاهش SV
- (ب) کاهش PAWP و افزایش CO
- (ج) افزایش BP دیاستولیک و کاهش BP سیستولیک
- (د) کاهش CVP و افزایش فشار دهلیز چپ

۷ - بیماری به دلیل کانتیوژن ریه در بیمارستان بستری شده است و در معرض ابتلا به سندروم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) قرار دارد، کدامیک از علائم و نشانه‌های زیر، علامت زودرس بروز ARDS بوده و نیاز به پایش دقیق دارد؟

- (الف) کراکل و رونکای منتشر در سمع ریه
- (ب) سیانوز و رنگ پریدگی بیمار
- (ج) بروز تاکی پنه و تنگی نفس
- (د) ظاهر سفیدرنگ ریه‌ها در رادیوگرافی

۸ - پرستار با مشاهده مانیتورینگ بیمار بستری در CCU، متوجه بروز تاکیکاردي بطنی حمله‌ای (PVT) می‌شود، اولین اقدام وی کدام است؟

- (الف) اعلام فوری کد احیا قلبی ریوی
- (ب) بررسی سطح هوشیاری بیمار
- (ج) آماده سازی شوک دیپریلیشن
- (د) آماده سازی شوک کاردیوورژن

۹ - آقای ۵۵ ساله با تشخیص سرطان پروستات، دارای سابقه فشار خون، رادیکال پروستاتکتومی شده است. برای کنترل فشار خون بیمار کدام دسته از داروهای زیر احتمال بی اختیاری ادرار مددجو را تشید می‌نماید؟

- (الف) مهارکننده کانال‌های کلسیمی
- (ب) مهارکننده گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک
- (ج) مهارکننده آنزیوتانسیون-آلدسترون
- (د) مهارکننده گیرنده‌های بتا

۱۰ - برای بیمار دچار شوک کاردیوژنیک با وزن ۵۰ کیلوگرم، پزشک معالج انفوژیون دوبامین به میزان $\frac{\mu\text{g}}{\text{kg}}$ ۴ در هر دقیقه را تجویز نموده است. در صورتی که ۲۰۰ میلی گرم آمیبول دوبامین در سرنگ ۵۰cc توسط NS رقیق شود، سرعت انفوژیون با استی چند $\frac{\text{ml}}{\text{hr}}$ بر روی سرنگ پمپ تنظیم گردد؟

- (د) ۶
- (ج) ۴/۵
- (ب) ۲
- (الف) ۱/۵

۱۱ - بیماری متعاقب ضربه به سر (head trauma) در بخش پذیرش شده است. از نقطه نظر پرستاری، بررسی کدام مورد در اولویت است؟

- (الف) سطح هوشیاری
- (ب) نبض و فشار خون بیمار
- (ج) سرعت و عمق تنفس
- (د) توانایی حرکت اندام

۱۲ - در بیمار مبتلا به میوکاردیت تحت درمان با دیگوکسین، کنترل کدام گروه از علائم زیر توسط پرستار مهم است؟

- (الف) دیسربتمی، آنورکسی، تهوع، استفراغ، سردید
- (ب) تغییر فشار خون، سوزن سوزن شدن اندام‌ها
- (ج) ضعف و بی حالی، تحریک پذیری، بیوست
- (د) دیسربتمی، هیبوکسی، تشنج

۱۳ - کدام تشخیص پرستاری در بیمار مبتلا به سندروم حاد کرونری (ACS) صحیح است؟

- (الف) اضطراب مرگ
- (ب) ریسک اختلال مایعات
- (ج) ریسک نارسایی اندام‌های حیاتی
- (د) احساس بی قدرتی

۱۴- برای بیمار مبتلا به پنومونی لوب تختانی چپ، دق و درناز وضعیتی تجویز شده است. وضعیت مناسب برای انجام این تکنیک کدام است؟

- الف) خوابیده به پهلوی راست با پاهای بالا
- ب) نیمه نشسته با زانوهای خمیده
- ج) خوابیده به شکم با خوابیده متمایل به چپ
- د) تنہ خمیده متمایل به جلو

۱۵- در مراقبت از بیماری که حین برونوکسکوبی، بیوپسی شده است، بروز کدامیک از یافته‌های زیر نیاز به گزارش فوری پرستار دارد؟

- الف) سرفه خشک
- ب) هماچوری
- ج) برونوکواسپاسم
- د) خلط با رگه‌های خونی

۱۶- بیماری تحت شیمی درمانی با دوکسوروبیسین و ۵-فلواوراسیل قرار دارد، پرستار کدام مورد زیر را جهت پیشگیری و کنترل استوتماتیت به وی آموزش می‌دهد؟

- الف) شستشوی مداوم دهان با مواد ضد عفونی کننده
- ب) مکیدن بین سه روز قبل، حین و سه روز پس از شیمی درمانی
- ج) بررسی مخاط دهان هر ۲ ساعت یک بار قبل، حین و پس از شیمی درمانی
- د) رعایت پهداشت دهان و اجتناب از صدمه زدن به مخاط

۱۷- به منظور پایش عوارض تزریق خون پس از ترانسفوزیون، کدام مورد زیر باید انجام شود؟

- الف) برقراری خط وریدی همراه با تزریق رینگر لاکات
- ب) کنترل میزان اشباع اکسیژن خون هر ۲ ساعت
- ج) بررسی تمونه ادرار بیمار از نظر وجود هموگلوبین
- د) تب بالا، اتساع ورید زیگولار، اضطراب و گیجی

۱۸- در مراقبت از بیماران پس از عمل جراحی کاتاراکت، کدام مورد صحیح است؟


- الف) گزارش حرقه زدن یا بروز نقاط نورانی در جلوی چشم
- ب) پوشیدن پد چشمی در سمت جراحی شده به مدت یک هفته
- ج) استفاده از قطره‌های گشادکننده مردمک به مدت ۶ ساعت
- د) خوابیدن به سمت چشم جراحی شده در شبها

۱۹- در موارد احتمال ایجاد سندروم فیزیولوژیک گچ در بیماران با گچ گیری تمام بدن، پرستار باید چه علائمی را پایش و گزارش نماید؟

- الف) صدای روده، نفخ، تهوع، استفراغ
- ب) علائم سایکولوژیک
- ج) علائم حیاتی، نکروز انتهایها
- د) اختلالات تنفسی

۲۰- مراقبت صحیح هنگام استفاده از جوراب ضد آمبولی بعد از جراحی تعویض مفصل ران، کدام است؟

- الف) در هر شیفت ۲۰ دقیقه خارج شود.
- ب) در شبها هنگام خواب خارج گردد.
- ج) به هیچ وجه خارج نشود.
- د) روزانه ۲۰ دقیقه خارج شود.



۲۱ - کدامیک از تشخیص‌های پرستاری زیر در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدیسم صحیح است؟

- (الف) تطابق غیر موثر ناشی از اختلالات فرآیند شناختی
- (ب) عدم تعادل تنفسی ای کمتر از نیازهای بدن
- (ج) عدم تحمل فعالیت ناشی از خستگی مفروط
- (د) الگوی غیر موثر تنفس ناشی از کاهش تهوعه

۲۲ - کدامیک از رویکردهای زیر ارتباط با مددجوی دارای اختلال شنوایی را تسهیل نمی‌کند؟

- (الف) تکرار صحبت
- (ب) صحبت با صدای بلند
- (ج) استفاده از تغییر حالات چهره
- (د) استفاده از روش نوشتاری

۲۳ - مددجوی مبتلا به هرپس سیمپلکس تنازلی شده است، کدام گزاره در مورد این عفونت صحیح است؟

- (الف) در دوران حاملگی ممکن است باعث سقط خودبهخودی یا زایمان زودرس شود.
- (ب) وزیکولهای پر از مایع و بدون درد که طی ۳ تا ۷ روز زخمی شده و بهبود می‌یابند.
- (ج) کراتوکونژونکتویتیت هرپتیک معمولاً دو طرفه است و باعث علائم سیستمیک می‌شود.
- (د) مددجو می‌تواند تماس جنسی داشته باشد، اما باید از کاندوم استفاده کند.

۲۴ - برای مددجویی که اخیراً گرافت یوستی داشته، توصیه پرستار کدام است؟

- (الف) از روش‌های استشار آرایشی استفاده کند.
- (ب) گرافت را از تور مستقیم خورشید محافظت کند.
- (ج) به فیزیوتراپی اندام ادامه دهد.
- (د) در محل گرافت لوپیون نرم کننده بمالد.

کودکان

۲۵ - کدامیک از توصیه‌های تنفسی زیر در سن نوبایی به کاهش وزن در بزرگسالی کمک می‌کند؟

- (الف) مصرف روزانه ۱۴ گرم فیبر ۱۰۰٪ کیلوکالری
- (ب) مصرف روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین D
- (ج) مصرف روزانه ۴۰۰ سی سی آبمیوه طبیعی تازه
- (د) مصرف روزانه ۱ عدد مکمل ویتامین C

۲۶ - به منظور کنترل رفتارهای خشونت‌آمیز فیزیکی و کلامی در کودک خردسال، بهترین توصیه به والدین کدام است؟

- (الف) کنترل نوع و مدت زمان تماسی برنامه‌های تلویزیونی
- (ب) نشان دادن عصبانیت در هنگام درگیری با کودک دیگر
- (ج) نظارت مستقیم بر بازی و تعامل کودک در پارک
- (د) تشویق و تنبیه کودک مبتنی بر موقعیت

۲۷ - در کدام مرحله سنی کودک هویت جنسی خود را درگ می‌کند؟

- (الف) نوبایی
- (ب) خردسالی
- (ج) نوجوانی
- (د) نوجوانی

۲۸- مناسب ترین روش برای آموزش دیسیپلین به کودک نوبای کدام است؟

- الف) نادیده گرفتن خطای رفتاری به دلیل سن کم
- ب) نشستن به مدت کوتاه رو به دیوار و دست به سینه
- ج) زدن چند ضربه ملایم به پشت دست یا پای کودک
- د) توضیح درباره رفتار اشتباه کودک

۲۹- مهم ترین معیار برای تشخیص سوء رفتار با کودک کدام است؟

- الف) عدم تطابق بین تاریخچه سلامت و معابنه محل آسیب
- ب) عقب ماندگی تکامل هوشی و عاطفی
- ج) خون مردگی های متعدد روی بدن
- د) بی اختیاری اداری نامناسب با سن

۳۰- در مراقبت از کودک مبتلا به کوژکتیویت، مهم ترین نکته آموزشی کدام است؟

- الف) پیشگیری از انتقال عفونت به سایر اعضا خانواده
- ب) جداسازی اثاق کودک از سایر اعضا خانواده
- ج) استحمام روزانه با آب و لرم
- د) کمپرس گرم هر سه ساعت

۳۱- ابتلا به بیماری مزمن در کدام دوره سنی منجر به اختلال در فرایند اجتماعی شدن کودک می شود؟

- الف) نوبایی
- ب) خردسالی
- ج) نوباوگی
- د) نوجوانی

۳۲- در آموزش به کودک ۴ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی (ADHD) دلیل تأکید بر رعایت پهداشت دهان و دندان، کدام است؟

- الف) ویژگی بیماری
- ب) عدم تمرکز کودک
- ج) داروهای تجویز شده
- د) سن کودک

۳۳- در هنگام مصاحبه با نوجوان دارای رفتار پر خطر، توجه به کدام نکته اهمیت دارد؟

- الف) انجام مصاحبه بدون حضور والدین
- ب) توضیح در خصوص عدم امکان رازداری پرستار
- ج) ارائه توصیه بر اساس تجربیات شخصی
- د) شروع مصاحبه با موضوع رفتار پر خطر

۳۴- مراقبت پرستاری در مصرف دیگوکسین برای کودکان و شیرخواران کدام است؟

- الف) محدودیت مصرف مایعات در شیرخوار
- ب) تکرار دوز دارو در صورت استفراغ کودک
- ج) دو برابر کردن دوز بعدی در صورت فراموشی یک دوز
- د) عدم مصرف همزمان دارو با مایعات و غذا

۳۵- مهم ترین نکته در مراقبت در منزل از شیرخوار، بعد از ترمیم مننگوسل کدام است؟

- الف) بررسی منظم از لحاظ آسیب پوستی
- ب) تعویض روزانه پانسمان
- ج) اندازه گیری هفتگی دور سر
- د) اندازه گیری روزانه دور شکم

سال ۱۴۰۱

مجموعه پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد

۳۶ - رژیم غذایی مناسب برای کودک مبتلا به فنیل کتون اوری متناسب با سطح فنیل آلتین کدام است؟

- (الف) محدودیت مایعات
- (ب) مصرف پروتئین
- (ج) محدودیت سبزیجات
- (د) مصرف لبنتیات

۳۷ - مقدار مایع نگهدارنده مورد نیاز یک کودک ۱۸ ماهه با وزن ۱۲ کیلوگرم چقدر است؟
 (الف) ۱۱۰۰ سی سی (ب) ۱۲۰۰ سی سی (ج) ۱۸۰۰ سی سی (د) ۲۴۰۰ سی سی

۳۸ - در کودک تحت رژیم درمانی بیماری سلیاک، احتمال بروز کدامیک از اختلالات زیر وجود دارد؟

- (الف) کمبود ویتامین B₁₂
- (ب) کمبود روی
- (ج) آنمی فقر آهن
- (د) آنمی داسی شکل

۳۹ - در طرح ترجیحی کودک بعد از جراحی تانسیلکتومی، کدام نکته باید مد نظر پرستار قرار گیرد؟

- (الف) تشویق کودک به مصرف مایعات گرم
- (ب) استفاده از استامینوفن کدنین در صورت درد
- (ج) تشویق به سرفه هر ۲ تا ۴ ساعت
- (د) توجه به علائم بلع مکرر

۴۰ - در سندروم اجوف فوقانی اولین اقدام پرستار کدام است؟

- (الف) برقراری راه هوایی
- (ب) قطع جریان مایع
- (ج) استفاده از کمپرس گرم بر روی موضع
- (د) پاسمنان فشاری بر روی موضع

۴۱ - کدام توضیح در خصوص اختلال هموفیلی صحیح است؟

- (الف) اختلال غالب وابسته به کروموزوم Y
- (ب) اختلال غالب وابسته به کروموزوم X
- (ج) اختلال مغلوب وابسته به کروموزوم X
- (د) اختلال مغلوب وابسته به کروموزوم Y

۴۲ - مراقبت پرستاری بعد از بیوپسی کلیه کدام است؟

- (الف) پوزیشن ترنزلنبرگ
- (ب) استراحت در تخت تا ۲۴ ساعت
- (ج) کنترل واکنش کودک به ماده حاجب
- (د) منع مصرف دهانی تا ۲۴ ساعت

۴۳ - راه انتقال هپاتیت A کدام است؟

- (الف) شیر مادر مبتلا
- (ب) مصرف غذای آلوده
- (ج) انتقال خون آلوده
- (د) تماس با فرد آلوده

۴۴ - در طرح ترخیص کودک مبتلا به سندرم نفروتیک، ناکید بر کدام مورد اهمیت دارد؟

- (الف) خروج انجام سالیانه آزمایش ادرار
- (ب) جلوگیری از تماس نزدیک با کودکان
- (ج) توجه به علائم عود بیماری
- (د) عدم انجام واکسیناسیون

۴۵ - در صورت نشتمانی شیمی درمانی به زیر پوست کودک، اولین اقدام پرستار کدام است؟

- (الف) قطع جریان دارو

(ب) شستشوی رگ با نرمال سالین

(ج) تزریق زیر جلدی کورتیکوسترونید

(د) استعمال پماد تراسیکلین ۱ درصد

۴۶ - مصرف کدامیک از داروهای زیر برای کودک زیر ۲ سال ممنوع است؟

- (الف) تروفیلین
- (ب) کرمولین سدیم
- (ج) تربوتالین
- (د) آلبوتول

۴۷ - مهم‌ترین مراقبت پرستاری در منزل کودک مبتلا به فیبروز کیستیک کدام است؟

(الف) مصرف زریم غذایی پرپروتئین

(ب) فیزیوتراپی قفسه سینه

(ج) تعییز کردن راه هوایی

(د) انجام تست عرق سالیانه

۴۸ - باور کودک خردسال نسبت به مرگ کدام است؟

(الف) مفهوم کاملی از مرگ دارد.

(ب) احساس گناه نسبت به مرگ نزدیکان دارد.

(ج) تفکرات او می‌تواند منجر به مرگ شود.

(د) تفاوتی بین مرگ و زندگی قاتل نیست.

بهداشت مادران و نوزادان

۴۹ - وجود موکوس بنفس-آبی در وازن نشانه چیست؟

(الف) علامت قطعی حاملگی

(ب) علامت احتمالی حاملگی

(ج) نشانه جفت سرراهمی

(د) نشانه عفونت کلامیدیا

۵۰ - کدامیک از تغییرات زیر در دوران حاملگی طبیعی محسوب می‌شود؟

(الف) هیپرتروفی مختصر قلب

(ب) افزایش فشارخون


(ج) کاهش گلبلول‌های قرمز

کاهش گلبلول‌های سفید

سال ۱۴۰۱

مجموعه پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد



۵۱ - بهترین زمان بررسی آنومالی‌های جنین کدام است؟

- الف) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص حاملگی
ب) ۱۷-۵۶ روز بعد از تشخیص حاملگی
ج) ۱۰-۱۷ روز بعد از تشخیص صدای قلب
د) ۱۷-۵۶ روز بعد از لفاح

۵۲ - در کدام گروه سنی ماموگرافی سالیانه توصیه می‌شود؟

- د) بالای ۷۵ سال ج) ۵۰ تا ۷۴ سال ب) زیر ۴۰ سال

۵۳ - موثرترین روش کاهش درد در هنگام زایمان کدام است؟

- د) بیهوشی عمومی ج) بی حسی اپیدورال ب) مرفین الف) نالوکان

۵۴ - در مراقبت از قربانی تجاوز جنسی، کدام اقدام پرستار در اولویت است؟

- الف) ارائه حمایت عاطفی و ارتباط حمایتی
ب) ارزیابی فوری وضعیت عاطفی و آسیب‌های جسمی
ج) اطمینان از حفظ «زنگیره نگهداری شواهد»
د) جمع آوری نمونه مو، سواب بzac و سوهان زیر ناخن

۵۵ - تاریخ تخمینی زایمان خانمی با قاعده‌گی منظم ۲۸ روزه که اولین روز آخرین قاعده‌گی اش اول فروردین ۱۴۰۱ می‌باشد، کدام است؟

- الف) ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ب) ۷ دی ماه ۱۴۰۱
ج) ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱
د) ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱

۵۶ - اولویت اول مراقبت پرستاری در استفراغ حاملگی کدام است؟

- الف) توصیه به مصرف مواد پر فiber
ب) تعیین شدت مشکل
ج) بررسی علامت حیاتی
د) توصیه به مصرف مواد کربوهیدرات

۵۷ - ابتلاء به کدام ویروس زیر در مادر بیشترین خطر را برای نوزاد و جنین دارد؟

- د) هرپس تناسلی الف) پاپلومای انسانی ب) هپاتیت C ج) هپاتیت B

۵۸ - کدامیک از موارد زیر در پیشگیری از پره اکلامپسی تأثیر ندارد؟

- الف) محدودیت مصرف سدیم
ب) درمان بیماری‌های لثه
ج) درمان عفونت‌های ادراری
د) مدیریت وزن

۵۹ - مهم‌ترین مراقبت پرستاری در حین استفاده از فورسپس برای زایمان کدام است؟

- الف) بررسی وزن از لحاظ کبدی و پارگی
ب) کنترل ضربان قلب جنین
ج) بررسی عصب صورتی نوزاد
د) بررسی هماتوم ساب دورال





۶۰- به منظور تسکین درد ناشی از تجمع گاز بعد از سزارین کدام اقدام صحیح است؟

(الف) مصرف شیر کامل

(ب) فشار ناحیه شکمی با بالش

(ج) قرار گرفتن به پهلوی چپ

(د) استفاده از نی برای مصرف مایعات

۶۱- بهترین پوزیشن بلا فاصله بعداز تشخیص برولاپس بند ناف کدام است؟

Sniff (د)

Lithotomy (ج)

Prone (ب) Trendelenburg

۶۲- کدام نوع از کیست های تخمدانی در ۵۰ درصد از موارد با مول هیداتی فرم همراه هستند؟

(الف) Follicular

(ب) Corpus Luteum

(ج) Theca-Lutein

(د) Polycystic ovary syndrom

۶۳- کدام مراقبت پرستاری بعد از هیسترکتومی واژینال صحیح است؟

(الف) خارج کردن سوند فولی حداکثر ۴ ساعت بعد از عمل

(ب) استفاده از کیسه آبگرم جهت تسکین درد ناحیه پرینه

(ج) ارزیابی علائم هومانس در بیمار

(د) تمرينات روزانه ورزشی پاها

۶۴- پرستار برای حفاظت از خود هنگام مراقبت از بیمار تحت رادیوتراپی داخلی رحم، ملزم به رعایت کدام مورد است؟

(الف) محدودیت تماس با بیمار حداکثر ۲ ساعت در شیفت

(ب) لزوم استفاده از پیشند سربی در حین شیفت

(ج) پوشیدن دستکش و گان در حین شیفت

(د) برداشتن ایمپلنت رادیواکتو با فورسیس سربی

۶۵- کدام شاخص نشان دهنده خطر مشکلات تغذیه ای در دوران بارداری است؟

(الف) حاملگی مکرر با سابقه سه بار بارداری در عرض ۲ سال

(ب) وزن گیری کمتر از ۱ کیلوگرم در ماه، در سه ماهه اول بارداری

(ج) وزن گیری بیش از ۲ کیلو گرم در ماه، بعد از سه ماهه اول بارداری

(د) بالا بودن مقدار هموگلوبین و هماتوکریت

۶۶- در زنان باردار با پیکای شدید به نشاسته ذرت، کدام عارضه مشاهده می شود؟

(الف) تولد نوزاد کم وزن

(ب) دیابت بارداری

(ج) افزایش هموگلوبین

(د) افزایش جذب کلسیم

۶۷- آموزش انجام نحوه صحیح بهداشت ناحیه پرینه به مددجویی با بیماری منتقله از طریق جنسی، در راستای کدام

تشخیص پرستاری زیر است؟

(الف) حفظ ناکافی سلامتی

(ب) اشکال در تعامل اجتماعی

(ج) اختلال در تمامیت بافتی

(د) اضطراب در رابطه با ابتلا به بیماری

۶۸ - کدامیک از موارد زیر، از عوامل شیمیایی موثر برای شروع تنفس نوزاد تازه متولد شده است؟

- (الف) کلامپ بند ناف نوزاد
- (ب) خشک و گرم کردن نوزاد
- (ج) افزایش فشار قفسه سینه حین زایمان
- (د) ساکشن مجاری هوایی و دهان نوزاد

۶۹ - کدام مراقبت پرستاری زیر در اتفاق زایمان در اولویت قرار دارد؟

- (الف) برقراری هرچه سریع‌تر تماس پوستی و چشمی با مادر
- (ب) تشویق مادر به شروع هر چه سریع‌تر شیردهی به نوزاد
- (ج) خشک کردن و پاک کردن ورنیکس از روی پوست نوزاد
- (د) تامین محیط حرارتی خنثی برای نوزاد تازه متولد شده

۷۰ - استفاده از کدام دارو در نوزادان متولد شده از مادر معتاد به نارکوتیک، کنتراندیکاسیون دارد؟

- (الف) مرفین
- (ب) نالوکسان
- (ج) فنوباربیتال
- (د) تروفیلین

۷۱ - هدف اصلی مراقبت پرستاری از نوزادان آسیب پذیر بستره، کدامیک از موارد زیر است؟

- (الف) ارتقاء رشد و تکامل با ایجاد محیطی شبیه به داخل رحم
- (ب) حفظ درجه حرارت با ایجاد محیطی شبیه به داخل رحم
- (ج) پیشگیری از مشکلات تنفسی
- (د) پیشگیری از مشکلات نزدیکی

۷۲ - تبدیل کلستروم به شیر کامل در چه زمانی بعد از تولد نوزاد اتفاق می‌افتد؟

- (الف) ۱۲-۸ ساعت
- (ب) ۴۸-۲۴ ساعت
- (ج) ۷۲-۴۸ ساعت
- (د) ۹۶-۷۲ ساعت

بهداشت جامعه

۷۳ - ارائه مراقبت به مددجو و خانواده در محل زندگی، محل کار یا مدرسه معرف کدام رویکرد پرستاری سلامت جامعه است؟

- (الف) Community based nursing
- (ب) Community nursing
- (ج) Family health nursing
- (د) Family practice

۷۴ - کدام گزینه از عملکردهای اصلی پرستار سلامت جامعه است؟

- (الف) بررسی و شناخت وضعیت سلامت افراد جامعه
- (ب) توسعه سیاست‌های مربوط به حمایت از مصرف کننده
- (ج) بیمه گری و توسعه خدمات بیمه افراد تحت پوشش
- (د) مدیریت مراکز و برنامه‌های بخش بهداشت

۷۵ - قوانین نامکتوب در گروه که موجب حرکت اعضا در جهت اهداف، تثبیت گروه و اطمینان از درک و تفسیر صحیح حقایق می‌شود کدام است؟

- (الف) همبستگی
- (ب) پویایی
- (ج) هنجار
- (د) بقا

- ۷۶ - اجرای برنامه بیاده روی برای بهبود رفتارهای بهداشتی مرتبط با سبک زندگی مردم، کدام سطح پیشگیری است؟
 (د) ثالثیه (ج) ثانویه (ب) اولیه (الف) جمعیتی
- ۷۷ - مبنای برآورد شاخص DA کدام است؟
 (الف) سال‌های عمر توانی و میزان مرگ و میر اختصاصی
 (ب) سال‌های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس و امید به زندگی
 (ج) میزان مرگ و میر خام، میزان تولد زنده و میزان ناتوانی اختصاصی
 (د) مدت زمان زندگی با ناتوانی و زمان از دست رفته به علت مرگ زودهنگام
- ۷۸ - بهترین روش برای ارزیابی اقتصادی بودن مداخلات بهداشتی، محاسبه کدام شاخص است؟
 (الف) تولید ناخالص ملی
 (ب) تولید خالص ملی
 (ج) تحلیل هزینه-خایده
 (د) تولید ناخالص داخلی
- ۷۹ - استفاده از کدهای اخلاق جهت هدایت عملکرد پرستاری، کدام سطح پیشگیری است?
 (د) ثالثیه (ج) ثانویه (ب) اولیه (الف) اساسی
- ۸۰ - کدامیک از عبارات زیر در مورد مدل مداخله چرخ () صحیح است?
 (الف) این مدل مددجو/بیمار محور است.
 (ب) شامل دو سطح عملکرد فردی و خانوادگی است.
 (ج) مداخلات از سه عامل متفاوت با ارزش مساوی تشکیل شده‌اند.
 (د) مداخلات این مدل شامل ۸ مداخله مراقبت بهداشتی اولیه است.
- ۸۱ - مشاهده مستقیم بیمار مبتلا به سل فعال در هنگام مصرف دارو، جهت اطمینان از رعایت رژیم دارویی، در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟
 (الف) اول (ب) دوم (ج) سوم (د) چهارم
- ۸۲ - ارگانوفسفات‌ها جزء کدام دسته از عوامل شیمیایی دسته بندی می‌شوند?
 (د) آفتکش‌ها (ج) گازهای محرک (ب) هیدروکربن‌ها (الف) ترکیبات فلزی
- ۸۳ - بهترین نشانگرهای وضع کلی آلایندگی هوا کدام است?
 (الف) دی‌اکسید گوگرد، دود و ذرات معلق
 (ب) نیترات‌ها، سرب، ازن لایه بالایی جو
 (ج) مونوکسید گوگرد، ازن، گاز رادن
 (د) ذرات معلق، هیدروکربن‌ها و نیتریت
- ۸۴ - سالمونلا از طریق مصرف کدام ماده غذایی به انسان انتقال می‌یابد؟
 (الف) گوشت سفید و قرمز
 (ب) تخم مرغ خام یا نیم پز
 (ج) سبزیجات و میوه‌جات
 (د) شیر و مواد لبنی

۸۵ - حد مطمئن فلوبنور در یک لیتر آب آشامیدنی کدام است؟

- (الف) ۰/۱۵ نا ۰/۸ میلی گرم
- (ب) ۱ تا ۵ میلی گرم
- (ج) ۰/۱۵ نا ۳ گرم
- (د) ۰/۱۵ نا ۱/۵ گرم

۸۶ - علت تجمع بیشتر مواد شیمیایی سمی در کودکان نسبت به بزرگسالان کدام است؟

- (الف) تکامل ناقص جدار روده کودکان نسبت به بزرگسالان
- (ب) مصرف بیشتر مایعات و میوه جات توسط بزرگسالان
- (ج) ناتوانی کلیه کودکان در فیلتراسیون کافی سوم
- (د) بیشتر بودن نسبت وزن به سطح بدن در بزرگسالان

۸۷ - مهم‌ترین و متدائل‌ترین روش تعیین درجه آلوگی فاضلاب شهری کدام است؟

- | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|
| SS (د) | BOD (ج) | TOC (ب) | COD (الف) |
|--------|---------|---------|-----------|

۸۸ - بیماری‌های تابشی جزء کدامیک از اثرات پرتوهای زیان‌بار است؟

- | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (د) زنتیکی دیررس | (ج) زنتیکی فوری | (ب) جسمی دیررس | (الف) جسمی فوری |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|

۸۹ - حداقل مدت زمان برای ساخت مسکن در زمین‌هایی که به روش خاک ریزی دستی هموار شده‌اند، چند سال است؟

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| ۲۰-۲۵ (د) | ۱۵-۲۰ (ج) | ۵-۱۰ (ب) | ۱-۵ (الف) |
|-----------|-----------|----------|-----------|

۹۰ - عامل انتقال بیماری خواب به انسان کدام است؟

- | | | | |
|---------|---------|--------------|----------------|
| (د) کنه | (ج) شپش | (ب) مگس تسنه | (الف) پشه خاکی |
|---------|---------|--------------|----------------|

۹۱ - مهم‌ترین نایهنجاری شناخته شده ناشی از کمبود مس در بدن کدام است؟

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|
| (د) پرکاری تیروئید | (ب) بیماری هوچکین | (ج) نوتروپنی | (الف) سیروز |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|

۹۲ - برای پاستوریزه کردن شیر در مقدار کم و در جوامع روستایی کدام روش توصیه می‌شود؟

- | | | | |
|---------|----------|------------|---------------|
| UHT (د) | HTST (ج) | Holder (ب) | Boiling (الف) |
|---------|----------|------------|---------------|

۹۳ - نقش فردی که در گروه تلاش می‌کند اختلافات بین اعضاء را کاهش دهد، کدام است؟

- | | | | |
|-----------|-------------|----------------|------------|
| (د) پیشرو | (ج) صلح‌ساز | (ب) دروازه‌بان | (الف) پیرو |
|-----------|-------------|----------------|------------|

۹۴ - اقدامات بهداشتی چهت پایش قند خون، کنترل مصرف مرتب داروها، حفظ رژیم و انجام منظم ورزش در بیمار مبتلا

به دیابت، مربوط به کدام سطح پیشگیری است؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|--------------|
| (د) سوم | (ج) دوم | (ب) اول | (الف) جمعیتی |
|---------|---------|---------|--------------|

۹۵ - کدام عامل در تعیین وضعیت سلامت جامعه سهم بیشتری دارد؟

- (الف) عوامل زیستی و وراثتی
- (ب) رفتارها و عادات بهداشتی
- (ج) مراکز ارائه خدمات بهداشتی
- (د) ویژگی‌های اجتماعی

۹۶ - درمان اصلی واکنش آنافیلاکسی به واکسن کدام است؟

- (الف) پوشاندن بدن بیمار با پتو و بالا بردن پاهای
- (ب) تجویز آنتی‌هیستامین و گشادکننده راه هوایی
- (ج) گرفتن رگ و شروع مایع درمانی برای بیمار
- (د) تزریق اپی‌نفرین داخل عضلانی یک در هزار

روان پرستاری

۹۷ - بیماری با کوچک‌ترین مسئله تحریک شده و به پرخاشگری می‌پردازد. شما به عنوان روان‌پرستار مشکل بیمار را نشانه‌ی کدام اختلال می‌دانید؟

- (الف) اختلال در محتوای فکر
- (ب) اختلال در ادراک
- (ج) عدم کنترل نکانه
- (د) بینش مختلط

۹۸ - بر اساس مدل استرس و سازگاری سلیمه، استراتژی‌های مقابله‌ای در کدام مرحله از پاسخ به استرس اثرگذار است؟

- (الف) ارزیابی شناختی اولیه
- (ب) ارزیابی شناختی ثانویه
- (ج) کیفیت پاسخ به استرس
- (د) عوامل تسریع‌کننده

۹۹ - یکی از تظاهرات مهم افسردگی در سالمندان، شکایت‌های متعدد جسمانی در آنان است. این علامت نشانه‌ی کدام مکانیسم دقاعی است؟

- (الف) جسمی‌سازی
- (ب) درونی‌سازی
- (ج) وارونه‌سازی
- (د) جابه‌جایی

۱۰۰ - کدام یک از موارد زیر بیانگر اعتماد به نفس بالا است؟

- (الف) واکنش هیجانی
- (ب) ثبات عاطفی
- (ج) احساس بزرگ بینی
- (د) درون گرایی

۱۰۱ - برای درمان افکار منفی بیمار مبتلا به افسردگی، کدام تکنیک زیر در روش شناخت درمانی برای درمان استفاده نمی‌شود؟

- (الف) طراحی یک تکلیف بازآندیشی
- (ب) طراحی یک سناریوی موقعیتی
- (ج) حساسیت‌زدایی تدریجی
- (د) گفت‌و‌گو درمانی

۱۰۲ - روان پرستار برای تقویت بهداشت فردی بیمار، به او قول می دهد بعد از هر بار حمام بتواند با خانواده خود تلفنی صحبت کند. این روش مطابق با کدامیک از رویکردهای روانشناسی است؟

- (الف) رفتار درمانی - روش پریماک
- (ب) شناخت درمانی - روش بک
- (ج) رفتار درمانی - اقتصاد پنهانی
- (د) شناخت درمانی - روش آلیس

۱۰۳ - بیمار دارای اختلال روان، به خونریزی های خود به خودی از بینی مبتلا می گردد. تشخیص شما چیست و مربوط به کدام دارو است؟

- (الف) سمومیت - لیتیم
- (ب) عوارض اکستراپرامیدال - پرفنازین
- (ج) دیسکرازی - والپروات سدیم
- (د) آگرانولوسیتوز - فلوکستین

۱۰۴ - بیمار به پرستار می گوید: «پلیس برای کشتن من فرستاده شده‌اند». بهترین پاسخ پرستار به این نگرانی بیمار چیست؟

- (الف) مگر چکار کردید که می خواهند شما را بکشند؟
- (ب) اینجا پلیس وجود ندارد، نگران نباشد.
- (ج) از این که افرادی قصد آسیب به شمارا دارند، نگران هستید؟
- (د) چرا فکر می کنید که پلیس برای کشتن شما فرستاده شده‌اند؟

۱۰۵ - بیماری مبتلا به دلیریوم در شب دچار گیجی و از دست دادن قدرت جهت یابی می شود. پرستار چه مداخله‌ای بایستی انجام دهد؟

- (الف) بیمار را به نزدیک ایستگاه پرستاری منتقل کند.
- (ب) از نور غیرمستقیم در طول شب استفاده کند.
- (ج) لامپ‌ها را در تمام شب روشن نگه دارد.
- (د) اتاق بیمار را با نور کافی همراه با یک موسیقی آرام نگه دارد.

۱۰۶ - بیماری با تشخیص افسردگی در بخش بستری شده است. مداخله مناسب در روزهای اول کدام است؟

- (الف) تشویق بیمار به خواندن و نوشتن آرام
- (ب) ایجاد امکان انجام فعالیت‌های مناسب ورزشی
- (ج) عدم درگیری بیمار در فعالیت‌های اجتماعی تا زمان درخواست او
- (د) ایجاد اینمنی برای بیمار و دیگران

۱۰۷ - بیماری ۲۴ ساعت قبل به علت شکستگی سر استخوان ران در بخش پذیرش شده است. کدامیک از موارد زیر احتمال دلیریوم ناشی از محرومیت از الکل را در این بیمار نشان می دهد؟

- (الف) افت فشارخون، آتاکسی، گرسنگی
- (ب) استوپور، لتارزی، سفتی عضلانی
- (ج) افت فشارخون، لرزش‌های واضح دست، لتارزی
- (د) بیقراری، تغییر در سطح هوشیاری، توهمند

۱۰۸ - بیماری پس از تلاش برای خودکشی با آویزان کردن خود با طناب، در بخش بستره شده است. بهترین راه برای این که پرستار از تامین امنیت بیمار مطمئن گردد، کدام است؟

- (الف) درخواست از یک بیمار دیگر برای ماندن کنار بیمار در همهی زمانها
- (ب) درآوردن لباس‌های بیمار و پوشاندن لباس بیمارستان
- (ج) اختصاص یک همکار برای نظارت بر بیمار در همهی اوقات
- (د) قرار دادن بیمار در اتاق ایزوله عاری از خطر

۱۰۹ - بیمار پس از یک ماه مصرف بوسپیرون برای معاینه به درمانگاه مراجعه کرده است. در صورت کاهش کدام علامت، دارو موثر بوده است؟

- (د) هذیان
- (ج) پرس افکار
- (ب) اضطراب
- (الف) افکار پارانویید

۱۱۰ - بیمار مبتلا به بی‌اشتهاای عصبی در حال ترجیح از بیمارستان، مدعی است که در طی مدت بستره لباس‌هایش تنگ شده و باید وزن خود را کاهش دهد. ارزیابی شما از این رفتار بیمار چیست؟

- (الف) احساس تردید بیمار برای ترجیح
- (ب) ایجاد اختلال در تصویر بدنی بیمار
- (ج) تشدید بی‌اشتهاای عصبی بیمار
- (د) رفتار طبیعی است و عدم نیاز به کاهش وزن

۱۱۱ - بیمار مبتلا به مانیک در زمان ملاقات، رفتارهای جنسی انجام می‌دهد و پس از تذکر پرستار در مورد نامناسب بودن این رفتار، شروع به توهین کلامی و پرخاشگری می‌کند. بر اساس تحلیل موقعیت، مداخله مناسب کدام است؟

- (الف) قرار دادن بیمار در اتاق انفرادی به مدت ۳۰ دقیقه
- (ب) تذکر به بیمار در مورد رفتار نامناسب او
- (ج) بردن بیمار به اتفاق با مشارکت همکاران دیگر
- (د) محرومیت بیمار از تماس تلفنی به مدت ۲۴ ساعت

۱۱۲ - حواس پرتی، گیجی، گوشه‌گیری و خشم در مددجوی قربانی تجاوز، نشانه‌ی کدام مورد است؟

- (الف) افسردگی
- (ب) حالت تدافعی
- (ج) خطر خودکشی
- (د) واکنش به رویداد

۱۱۳ - بیماری از ترس مسخره شدن توسط دیگران، در مهمنانی‌ها شرکت نمی‌کند. به نظر شما این بیمار احتمالاً مبتلا به کدام اختلال شخصیتی زیر است؟

- (د) واپسی
- (ج) وسواسی
- (ب) اسکیزوپریون
- (الف) اجتنابی

۱۱۴ - بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا در حال ترجیح با داروی رسپریدون ۲ میلی‌گرم روزانه است. آموزش قبل از ترجیح در این بیمار کدام است؟

- (الف) نور خورشید کافی دریافت کند.
- (ب) می‌تواند بدون نگرانی رانندگی کند.
- (ج) از غذاهای پرپیتامیم پرهیز کند.
- (د) در هنگام تغییر پوزیشن، به آرامی از جا برخیزد.

۱۱۵ - رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی در کدام مرحله از ابتلا به اسکیزوفرنیا بروز پیدا می‌کند؟

- (الف) Premorbid phase
- (ب) Residual phase
- (ج) Active psychotic phase
- (د) Prodromal phase

۱۱۶ - برای کمک به بیمار مبتلا به وسواس فکری- جبری، کدامیک از موارد زیر، روش بازداری متقابل است؟

- (الف) آموزش تکنیک‌های آرام‌سازی
- (ب) آموزش توقف افکار منفی و اتوماتیک
- (ج) آموزش غرفه سازی
- (د) انجام روان‌درمانی حمایتی فردی

۱۱۷ - به مادر کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی توصیه می‌کنید که اهداف کوتاه‌مدت را برای کاهش خشم کودک در سن مدرسه برنامه‌ریزی کند. دلیل انجام این مداخله چیست؟

- (الف) اعتماد به نفس پایین
- (ب) عدم توانایی کنترل تکانه
- (ج) عدم تحمل سرخوردگی
- (د) دامنه تمرکز کم

در کودکان کدام گزینه نادرست است؟

۱۱۸ - در خصوص DD

(الف) کودک دارای رفتارهای منفعل-پرخاشگر است.

(ب) رفتارهای لجبازی نسبت به والدین بروز پیدا می‌کند.

(ج) کودک علت لجبازی را خواسته‌های غیرمنطقی دیگران تلقی می‌کند.

(د) منفی کاری نشانه اصلی این اختلال است.

۱۱۹ - اختلال در قضاوت اجتماعی، مربوط به کدام قسمت مغز است؟

(الف) هیپوپotalamus

(ب) امیگدال

(ج) کورنکس فرونتال و پره فرونتال

(د) ساختارهای لیمبیک

۱۲۰ - بیمار با تشخیص اضطراب مزمن در حال ترجیح است. کدام روش مراقبتی توصیه می‌شود؟

(الف) پس زدن احساسات اضطراب بیمار

(ب) شناسایی موقعیت‌های ایجاد کننده اضطراب

(ج) ادامه مشاوره روان‌درمانی پس از ترجیح

(د) حذف موقعیت‌های اضطراب‌آور



زبان عمومی

D

- A

- a) chronic
- b) hereditary
- c) congenital
- d) contagious

- on his forehead after he bumped into the d

- a) debris
- b) buffer
- c) bruise
- d) decay

-

- a) potentiated
- b) revitalized
- c) debilitated
- d) provoked

-

- a) condensation
- b) consensus
- c) concession
- d) confession

-

- a) equilibrium
- b) disintegration
- c) conservation
- d) decomposition

-

- a) stimulation
- b) discrimination
- c) hallucination
- d) defensiveness

-

- a) remittance
- b) incidence
- c) redundancy
- d) potency

- The of the snakebite victim's health shows that she has not received the proper

- a) provision
- b) deterioration
- c) inflammation
- d) fortification

-

- a) rewarding
- b) lucrative
- c) detrimental
- d) advantageous

- When her pain didn't ,

- a) recur
- b) ascend
- c) persist
- d) subside





سال ۱۴۰۱

مجموعہ پرستاری

آزمون کارشناس ارشد



(a) intake

(b) inrush

(c) upshot

(d) upturn

.....

(a) converted

(b) attenuated

(c) exacerbated

(d) inverted

.....

(a) inadvertent

(b) unrestrained

(c) incompetent

(d) unsound

— D ions, the nurses' motivation is ; they usually give

(a) disclosed

(b) dissipated

(c) amplified

(d) augmented

— Because of medical costs, some people avoid regular check

(a) soaring

(b) deflating

(c) diminishing

(d) soaking

.....

(a) collide with

(b) diverge from

(c) assimilate into

(d) clash with

— The drivers' traffic regulations is one of the factors leading to deadly accidents.

(a) commitment to

(b) adherence to

(c) inheritance of

(d) violation of

— goals in your mind that are not easy to ; these are just idealistic rather

(a) scatter

(b) attain

(c) diminish

(d) intimidate

— A

..... points about the mechanisms of the nervous system.

(a) deliberate

(b) ubiquitous

(c) obscure

(d) notorious

— Some small clicking, bubbling, or rattling sounds become in the lungs when a person

(a) laudable

(b) audible

(c) viable

(d) feasible





Mortality data can help focus activities and resource allocation among sectors such as transportation, food, agriculture, and the environment as well as health. COVID-19 has highlighted the importance for countries to invest in civil registration and vital statistics systems to allow daily counting of deaths, and direct prevention and treatment efforts. It has also revealed inherent fragmentation in data collection systems in most low-income countries, where policy-makers still do not know with confidence how many people die and of what causes. To address critical gap, WHO has partnered with global actors to launch "Revealing the Toll of COVID-19: Technical Package for Rapid Mortality Surveillance and Epidemic Response". By providing the tools and guidance for rapid mortality surveillance, countries can collect data on total number of deaths by day, week, sex, age and location, thus enabling health leaders to trigger more timely efforts for the improvement of health. Furthermore, WHO develops standards and best practices for data collection, processing, and synthesis through the consolidated and improved 'International Classification of Diseases' (ICD-11) – a digital platform that facilitates reporting of timely and accurate data for causes of death for countries to routinely generate and use health information that conforms to international standards.

- a) mortality data measurement
- b) health systems effectiveness
- c) health systems resource allocation
- d) health activities in different sectors

- A

D 19 has

- a) improved confidence in policy makers in treatment efforts
- b) revealed the stable health infrastructure in countries
- c) helped the discovery of the causes of deaths in low-income countries
- d) contributed to the improvement of vital statistics systems

- The underlined word " " refers to the problems with.....

- a) prevention and treatment efforts
- b) fragmented low-income countries
- c) health statistics systems
- d) policy-makers' confidence

- The purpose of the recent WHO initiative global actors is to.....

- a) reveal the causes of COVID-19
- b) monitor countries in terms of COVID-19 infection
- c) keep a detailed record of COVID-19 mortalities
- d) isolate COVID-19 data in terms of sex, age, and location

-

D D 11)

- a) includes health information generation and use of the causes of death
- b) consolidates the international causes of death around the world
- c) is based on the national standards of countries
- d) is a platform for controlling the causes of the COVID-19 disease

In health forums, one frequently hears government authorities stating that "Brazil is not a poor country, it is an unjust one". Although this acknowledgement is a positive fact, dealing with this situation is still far from satisfactory. The truth is that actions are marked by what one could describe as timidity on behalf of our governors and health officials.

Recognition by the government that this is an unjust country points to the need to articulate the question of poverty with that of social inequality and poor health infrastructure. This means that the question of overcoming poverty and potential health issues should be associated with measures for redistribution, either by direct transfer of income, or indirectly, through social policies and health measures.

However, a series of obstacles are hindering the pursuance of this objective. The first of these concerns the structural adjustment and health economic stability model adopted, known as passive adjustment, with promotion of what could be called a "dictatorship of the economists". Decisive questions for Brazilian society are monopolized by health economic policies. This sets the scene for the practice -along with the preaching- of the well-known antinomy between health economic development and social development that must urgently be overcome.

- Brazil is described as an example of countries

- a) with positive facts on combating poverty
- b) demonstrating success in removing injustice
- c) suffering from inequity in wealth distribution
- d) with authorities determined to remove injustice

- The underlined term "this acknowledgement" refers to

- a) positive fact
- b) what one hears
- c) Brazil, an example of a poor but a just country
- d) Brazil being a rich but an unjust country

- The second paragraph mainly

- a) contradicts redistribution of income
- b) attributes poverty to social inequity
- c) suggests direct transfer of government income to the poor
- d) gives evidence on the transfer of income through social policies

- The "structural adjustment and economic stability model" to combat poverty by

- a) seek support from the political dictatorship
- b) have successfully been adopted
- c) are the writers' suggestions
- d) could serve as a barrier

- A solution to remove poverty and achieve equity is to economic development and social

- a) get rid of the contradiction between
- b) overlook the existing status of
- c) underestimate the significance of
- d) continue preaching in favor of existing



Everyone knows what a health service is, but ideas about what public health are more blurred. The public is confused about public health and uncertain what it means in practice. In the UK, they might associate public health with cleanliness, sanitation, environmental health, inspection of housing, or of food outlets. Professionals working in the public health field would see it differently—but they would not agree among themselves either. They might see it as something called 'health promotion' or as activities called 'social marketing'. In the United States or in Southern or Northern Europe, the focus would be different. The public health traditions in these countries vary in line with their different histories. For example, in the United States, claims on public health issues in courts are common, but state involvement is less so, while some Scandinavian countries have a tradition of state involvement or even state ownership of industries (e.g., alcohol) which are connected with public health.

— The definition of public health is worldwide.

- a) unified
- b) vague
- c) explicit
- d) conclusive

- a) food markets
- b) hygiene
- c) health promotion
- d) environment

— The writer has mentioned "Scandinavian countries" as an example of public health .

- a) government engagement in
- b) state's claims on
- c) professionals' engagement in
- d) people's claims on

— According to the passage, the public and the professionals.....

- a) coordinate the development of public health
- b) have similar views about health definition
- c) have different perceptions on public health
- d) acknowledge governments' ownership of health

— A

- a) Scandinavian countries are controlling alcoholism.
- b) A country's public health and history are connected.
- c) Legal actions against health is uncommon in the US.
- d) Scandinavian governments restrict public health industries.





بسمه تعالیٰ

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد. تا کار رسیدگی با سرعت و دقیق بیشتری انجام گیرد.

ضمیم تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ از طریق سایت اینترنتی
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۴ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر نداده نخواهد شد.
- از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برج و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:		
نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:		نوع دفترچه:
نام منبع معتبر:	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد بررسی:

- بین از یک جواب صحیح دارد (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- منش سوال صحیح نیست.

توضیحات

