

عصر

پنجشنبه

۹۵/۲/۲۳

مجموعه کارشناسی ارشد

بنام آنکه جان را فرست آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی «ب»

تعداد سئوالات : ۱۶۰

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات : ۲۲

مشخصات داوطلب:

نام و نام خانوادگی:

شماره کارت:

ضرایب دروس								رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپردازی در مامایی و افزایش آن	تجربهای دانشی و جوانی مربوط	به مامایی	شناسنی	نویزان و مرقبهای مربوط	تدابع، قیمتیه مادر و کودک و کودکه	تنظیم فواید	
۲	۰	۱	۱	۲	۲	۴	۰	مامایی
۲	۲	۰	۰	۲	۳	۳	۰	مشاوره در مامایی

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

جنین‌شناسی

۱ - در کدام ماه مادر می‌تواند حرکات جنین را برای اولین بار حس کند؟

(د) ۹

(ج) ۷

(ب) ۵

(الف) ۳

۲ - کدام مورد بعد از لقاح اتفاق می‌افتد؟

(الف) کامل شدن دومین تقسیم میوزی

(ب) کامل شدن اولین تقسیم میوزی

(ج) شروع اولین تقسیم میوزی

(د) شروع دومین تقسیم میوزی

۳ - کدام مورد در دومین هفته تکامل رخ می‌دهد؟

(الف) تشکیل زائدۀ آلات‌تؤییس

(ب) تشکیل سلوم خارج رویانی

(ج) پیدایش شیار اولیه

(د) ظهرور اولین زوج سومیت‌ها

۴ - همه موارد زیر اندیکاسیون‌های تشخیص قبل از تولد نظیر آمنیو سنتر و بیوپسی پرזהای کوریونی می‌باشد، بجز:

(الف) سابقه خانوادگی مشکل ژنتیکی

(ب) سن بالای مادر

(ج) سن بالای پدر

(د) اختلالات کروموزومی در یکی از والدین

۵ - دم جنین در کدام مرحله ناپدید می‌گردد؟

(الف) تا پایان اولین ماه حاملگی

(ب) تا پایان دومین ماه حاملگی

(ج) طی سومین ماه حاملگی

(د) طی چهارمین ماه حاملگی

۶ - همه ساختارهای زیر بوسیله سلول‌های سن سی‌سیال پوشیده شده‌اند، بجز:

(الف) پرזהای اصلی

(ب) سپتومها

(ج) پرזהای آزاد

(د) پرזהای چسبیده در محل اتصال

۷ - کدام استخوان جمجمه جزو کندروکرانیوم محسوب می‌شود؟

(د) پیشانی

(ج) تنه اسفنوئید

(ب) پس سری

(الف) استخوان آهیانه

۸ - منشاء عضلات اندام‌ها کدام است؟

(الف) سلول‌های نورال کرستی مهاجر

(ب) مزانشیم موضعی

(ج) میوتوم سومیت‌ها

(د) سلول‌های بنیادی جوانه‌های اندام‌ها

مجموعه مامایی «ب»

- ۹ - توسعه بیشتر دهلیز چپ ناشی از شرکت کدام ساختمان می‌باشد؟
- الف) سینوس وریدی راست ج) دهلیز چپ اولیه ب) وریدهای ریوی
- ۱۰ - همه اختلال‌های زیر در تترالوژی فالوت دیده می‌شوند، بجز:
- الف) تنگی شریان ریوی
ب) نقص در سپتوم بین بطی
ج) خونگیری آئورت از هر دو بطن
د) هیپرتروفی بطن چپ
- ۱۱ - سلول‌های سورفاکتانت ساز در کدام مرحله تکاملی تمایز می‌یابند؟
- الف) مرحله غده‌ای کاذب ج) مرحله کانالیکولار
- ۱۲ - کدام ساختار از بقایای مزوگاستر شکمی است؟
- الف) چادرینه بزرگ ب) رباط داسی شکل
- ۱۳ - اولین استخوانی که در دوره رویانی استخوان‌سازی را شروع می‌کند، کدام است؟
- الف) استرنوم ب) هومروس ج) ترقوه
- ۱۴ - کدام ناهنجاری مادرزادی سبب اولیگو هیدرآمنیوس می‌شود؟
- الف) آذنی کلیه‌ها ب) آذنی تخمدان‌ها ج) آنانسفالی
- ۱۵ - منشاء مجاري جمع‌کننده کلیه متانفریک کدام است؟
- الف) جوانه حالبی ب) وزیکول کلیوی
- ۱۶ - کدام ساختار زیر از تکمه تناسلی منشاء می‌گیرد؟
- الف) فالوس ب) چین اورترال
- ۱۷ - شاخ خلفی نخاع از کدام یک منشاء می‌گیرد؟
- الف) صفحه قاعده‌ای ب) صفحه بالی ج) صفحه سقفی
- ۱۸ - طی تکامل گنادها کدام ساختمان تحت تاثیر ژن SRY می‌باشد؟
- الف) تشکیل طناب جنسی اولیه
ب) ادامه رشد طناب‌های جنسی اولیه
ج) تشکیل طناب‌های قشری
د) تمایز سلول‌های جنسی اولیه
- ۱۹ - منشاء گانگلیون‌های پشتی نخاع کدام است؟
- الف) نوروپی‌تلیوم ب) لایه جبهای لوله عصبی ج) صفحات قاعده‌ای
- ۲۰ - منشاء گوش داخلی کدام است؟
- الف) مزودرم ب) اندودرم
- د) سلول‌های ستیغ عصبی ج) دیواره رومبانسفال



بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

۲۱ - همه موارد زیر از نشانگرهای تدارک مراقبت‌های بهداشتی می‌باشند، بجز:

- (د) استفاده از خدمات سلامت (ج) در دسترس بودن (ب) تخصیص منابع (الف) در اختیار بودن

۲۲ - براساس دستورالعمل کشوری، در غربالگری ناهنجاری جنینی کدام گزینه صحیح است؟

(الف) در غربالگری سه ماهه دوم، سونوگرافی لوله عصبی ضروری است.

(ب) نتیجه پرخطر غربالگری سه ماهه دوم، نیاز به ختم بارداری دارد.

(ج) در دوقلویی معیار آزمایشگاهی صحت کافی ندارد، معیار سن مادر و سونوگرافی مهم است.

(د) تنها معیار دسته بندی خطر در غربالگری سه ماهه اول ترانس لوسنی گردن است.

۲۳ - افزایش خطر آنمی مادری و تولد پیش از موعد با کمبود کدامیک از ویتامین‌های زیر همراه است؟

- (C) C (B₁₂) (B₆) (A) (الف)

۲۴ - در کدام مرحله از چرخه جمعیت شناسی علی رغم کاهش میزان مرگ و همچنین کاهش میزان موالید، جمعیت همچنان افزایش می‌یابد؟

- (د) چهارم (ج) سوم (ب) دوم (الف) اول

۲۵ - همه شرایط زیر از موارد منع مصرف مطلق قرص‌های ضدبارداری ترکیبی می‌باشند، بجز:

(الف) فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۶۰

(ب) سابقه بیماری ایسکمیک قلبی

(ج) سرطان مشکوک پستان

(د) سرطان آندومتر

۲۶ - حداقل چند ساعت بعد از نزدیکی باید کاندوم زنانه در وازن باقی گذاشته شود؟

- (الف) چهار
(ب) شش
(ج) هشت
(د) ده

۲۷ - با توجه به اطلاعات داده شده در جدول میزان باروری کلی را محاسبه نمایید.

میزان باروری اختصاصی سنی به ازای هزار زن					
۴۵-۴۹	۴۰-۴۴	۳۵-۳۹	۳۰-۳۴	۲۵-۲۹	۲۰-۲۴
۱۰	۲۰	۵۰	۱۰۰	۵۰	۲۰

(الف) ۱/۰

(ب) ۱/۲۵

(ج) ۱/۵

(د) ۲/۰

۲۸ - جهت تعیین ارتباط سیگار کشیدن مادر با ناهنجاری جنینی، ۱۰۰ نوزاد ناهنجار با ۳۰۰ نوزاد طبیعی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. نوع مطالعه چیست؟

(الف) مورد شاهدی (Case-control)

(ب) همگروهی (Cohort)

(ج) مقطعی (Cross-sectional)

(د) طولی (Longitudinal)

مجموعه مامایی «ب»

۲۹ - کودکی در دوران نوزادی دچار زردی شدید شده است. تجویز کدامیک از واکسن های زیر برای وی منع استفاده دارد؟
 د) هیچ کدام BCG ج) فلج اطفال ب) سه گانه

۳۰ - در کدامیک از انواع هپاتیت بیشترین شانس انتقال بیماری از مادر به جنین وجود دارد؟
 د) با HBeAg مثبت E) با HBSAg مثبت ج) C

۳۱ - در صورتی که خانمی باردار جهت مراقبت پره ناتال به درمانگاه مراجعه نماید و تست VDRL وی مثبت باشد، اقدام بعدی شما چیست؟

- (الف) درخواست تکرار آزمایش VDRL به ویژه در جمعیت های با شیوع سیفلیس بالا
- (ب) درخواست آنتی بادی - تروپونمایی (FTA-ABS)
- (ج) درمان با پنی سیلین کریستال
- (د) درمان با پنی سیلین بنزاتین

۳۲ - همه گزینه ها در مورد ضرورت تکرار آزمون HIV در سه ماهه سوم بارداری صحیح است، بجز:

- (الف) زنانی با چند شریک جنسی
- (ب) زنان با سوء مصرف مواد
- (ج) زنان باردار با سابقه بیماری اتوایمیون
- (د) ابتلا به STIs در طی بارداری

۳۳ - تکامل تطبیقی به طور معمول از چه سنی در کودک شروع می شود؟

- (الف) ۲ ماهگی
- (ب) ۳ ماهگی
- (ج) ۴-۵ ماهگی
- (د) ۶-۸ ماهگی

۳۴ - مهمترین عامل تعیین کننده احتمال بقای کودک چیست؟

- (الف) ابتلا مکرر به عفونت های تنفسی
- (ب) وزن حین تولد نوزاد
- (ج) وضعیت اقتصادی مادر
- (د) ابتلا مکرر به عفونت های گوارشی

۳۵ - کودک سه ساله با دهیدراتاسیون متوسط، به دلیل گاستروآنتریت به درمانگاه مراجعه می کند. اقدام بعدی شما چیست؟

- (الف) تجویز ۵۰ سی سی سرم قندی - نمکی وریدی به ازای هر کیلوگرم در ۲۴ ساعت
- (ب) تجویز ۱۵۰ سی سی سرم قندی - نمکی وریدی به ازای هر کیلوگرم در ۲۴ ساعت
- (ج) احتیاجی به مایع درمانی وریدی ندارد و تجویز ORS کافی است
- (د) اقدام خاصی نیاز ندارد، فقط مصرف مایعات بیشتر توصیه می شود

۳۶ - در ارزیابی تکامل سنی مرحله ای (ASQ) کودکان، براساس دستور العمل کشوری کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) برای کلیه کودکان تا ۶۰ ماهگی پرسشنامه ASQ تکمیل می گردد.
- (ب) این ابزار دارای پنج حیطه بررسی ابعاد تکاملی - مهارتی است.
- (ج) تکمیل پرسشنامه و ارزیابی تکاملی - مهارتی کودک برای نوزاد نارس مشابه نوزاد ترم است.
- (د) اگر امتیاز حداقل یکی از حیطه ها کمتر از یک انحراف معیار پایین تر از میانه مرجع بود، به پزشک ارجاع داده شود.



۳۷ - شاخص «درصد فراوانی آگاهی دانش آموزان نسبت به پهداشت بلوغ» جزء کدام دسته از مشخصه های ارزشیابی برنامه سلامت بازرسی جوانان است؟

- (الف) برون داد (Output)
- (ب) اثر واسطه
- (ج) اثر نهایی (Impact)
- (د) درون زاد (Input)

۳۸ - منارک زودرس موجب کدامیک از موارد زیر می گردد؟

- (الف) افزایش قد در بزرگسالی
- (ب) کوتاهی قد در بزرگسالی
- (ج) کاهش سن یائسگی در میانسالی
- (د) افزایش میزان استئوپروز در میانسالی

۳۹ - کلسیم و ویتامین D مکمل مورد نیاز در زنان یائسه ای که تحت هورمون درمانی (HRT) هستند، در روز به چه میزان است؟

- (الف) ۵۰۰ میلی گرم کلسیم + ۲۰۰۰-۱۰۰۰ واحد ویتامین D
- (ب) ۱۰۰۰ میلی گرم کلسیم + ۲۰۰۰ واحد ویتامین D
- (ج) ۱۰۰۰ میلی گرم کلسیم + ۵۰۰ واحد ویتامین D
- (د) ۱۵۰۰ میلی گرم کلسیم + ۲۰۰۰ واحد ویتامین D

۴۰ - یک خانم یائسه که به مدت ۸ ماه است از درمان ترکیبی ۰/۶۲۵ میلی گرم استروژن کنژوگه و ۲/۵ میلی گرم مdroکسی پروژسترلون استات به صورت مداوم استفاده می کند، دچار خونریزی Break through شده است. در سونوگرافی ضخامت آندومتر ۳ میلی متر است. تشخیص و اقدام شما چیست؟

- (الف) خونریزی ناشی از غلبه پروژسترلون است-کاهش میزان پروژسترلون
- (ب) خونریزی ناشی از آتروفی آندومتر است - افزایش دوز استروژن
- (ج) خونریزی ناشی از آتروفی آندومتر است - استفاده از درمان هورمونی متناوب
- (د) خونریزی ناشی از بدخيمي آندومتر است - قطع درمان هورمونی

بارداری و زایمان و بیماری های زنان

۴۱ - کدامیک از جملات زیر در خصوص صرع در بارداری صحیح است؟

- (الف) درمان با والپروئیک اسید به صورت روتین توصیه می شود.
- (ب) همه رژیم های تک دارویی در دوران بارداری برای جنین بی ضرر هستند.
- (ج) مصرف داروی ضد صرع در بارداری ممکن است منجر به وقوع ناهنجاری شود.
- (د) معمولا درمان با رژیم تک دارویی در بارداری توصیه نمی شود.

۴۲ - همه موارد زیر در ارتباط با علت سوزش سردل بارداری صحیح است، بجز:

- الف) رفلکس ترشحات اسیدی به مری
- (ب) کاهش تون اسفتگتر تحتانی مری
- (ج) بالا بودن فشار داخل مری
- (د) کاهش حرکات پریستالتیسم مری

۴۳ - کدام عبارت در ارتباط با عملکرد کلیه در بارداری صحیح است؟

- الف) افزایش میزان ترشح پروتئین و گلوکز
- ب) افزایش آستانه بی کربنات کلیوی
- ج) کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی
- د) کاهش میزان کراتینین ادرار

۴۴ - انجام آمنیوسنتز به منظور تشخیص بیماری های ژنتیکی جنین در چه زمانی از بارداری صورت می گیرد؟

- الف) قبل از هفته ۱۰
- ب) هفته ۱۱-۱۴
- ج) هفته ۱۵-۲۰
- د) بعد از هفته ۲۰

۴۵ - اگر آلفافیتوپروتئین (AFP) سرم مادر در حاملگی MOM ≥ 2 باشد، اولین اقدام کدام است؟

- الف) مشاوره ژنتیک
- ب) سونوگرافی استاندارد
- ج) AFP مجدد
- د) آمنیوسنتز

۴۶ - در خانمی که سابقه مول هیداتیفرم داشته و با علائم خونریزی نامنظم مراجعه می کند، کدام اقدام صحیح است؟

- الف) اندازه گیری β hCG، سونوگرافی، تخلیه رحم و پایش ماهانه β hCG پس از تخلیه
- ب) تخلیه رحم، پایش هفتگی β hCG پس از تخلیه
- ج) اندازه گیری β hCG، سونوگرافی، تخلیه رحم، پایش هر ۴۸ ساعت تا دستیابی به β hCG غیرقابل تشخیص
- د) اندازه گیری β hCG، سونوگرافی، تخلیه رحمی، پایش هفتگی تا دستیابی به β hCG غیرقابل تشخیص

۴۷ - خانمی ۲۱ ساله G2P0 در هفته ۳۲ بارداری دچار خونریزی $1+$ بدون درد شده است. اقدام بعدی شما چیست؟

- الف) ختم حاملگی به شیوه زایمان واژینال
- ب) بستری و تحت نظر
- ج) ختم حاملگی به شیوه سزارین
- د) تزریق کورتون برای رسیدن ریه جنین

۴۸ - مهمترین عامل پیش بینی کننده و بروز دکولمان چیست؟

- الف) سن و پاریتی
- ب) مصرف سیگار و کوکائین
- ج) سابقه جدا شدن جفت در بارداری های قبلی
- د) ترومما

۴۹ - یک خانم نولی پار و مبتلا به پره اکلامپسی شدید یک دوز ۴ گرمی سولفات منیزیم به صورت وریدی و یک دوز ۱۰ گرمی را به صورت عضلانی دریافت نموده است، ۲۰ دقیقه پس از دریافت آخرین دوز دچار تشنج شده است. اقدام بعدی شما چیست؟

- الف) تجویز ۲ گرم سولفات منیزیم به صورت عضلانی
- ب) تجویز ۲ گرم سولفات منیزیم به صورت وریدی
- ج) تجویز یک دوز هیدرالازین به صورت وریدی
- د) تجویز یک دوز دیورتیک به صورت وریدی

۵۰ - یک خانم G2P1، با سن حاملگی ۴۱/۵ هفته، صدای قلب جنین خوب، مایع آمنیوتیک مكونیوم و نمره بیشاب ۴ مراجعه کرده است. چه درمانی را برای وی پیشنهاد می کنید؟

- الف) القاء زایمان با اکسی توسین
- ب) القاء زایمان با پروستا گلاندین E₂
- ج) سزارین
- د) درمان انتظاری

۵۱ - خانم ۴۵ ساله G3P2 با شروع خونریزی، دردهای زایمانی و $FHR=140$ در دقیقه در بخش لیبر بستوی شده است. اداره زایمان ترجیحاً چگونه است؟

(الف) تجویز اکسی توسین، کنترل انقباضات رحمی و FHR به طور روتین

(ب) کنترل روتین انقباضات رحمی و FHR

(ج) تجویز واژینال E₁ PG، و قطع آن در صورت تاکی سیستول رحمی

(د) آمنیوتومی، تجویز اکسی توسین با دوز پایین، کنترل روتین انقباضات رحمی و FHR

۵۲ - براساس پیشنهاد انجمن زنان و مامایی آمریکا کلیه موارد زیر به عنوان شرط لازم برای تشخیص فاز فعال نرمال زایمان محسوب می شود به جز:

(الف) وجود دیلاتاسیون سرویکس حداقل ۴ سانتیمتر

(ب) وجود الگوی انقباضی رحمی ۲۰ واحد موئنه ویدئو

(ج) وجود سه انقباض رحمی در ۱۰ دقیقه

(د) وجود افاسمان سرویکس حداقل ۷۰٪

۵۳ - خانمی G2P1 با سن بارداری ۳۴ هفته و پارگی پرده ها که از ۱۲ ساعت پیش شروع شده است به درمانگاه مراجعه می کند. در معاينه واژینال سرویکس بسته و خلفی می باشد. اقدام مناسب چیست؟

(الف) ختم حاملگی با انجام سزارین

(ب) بستری و تجویز توکولتیک

(ج) تجویز آنتی بیوتیک و القاء زایمان

(د) تجویز آنتی بیوتیک و تحت نظر گرفتن

۵۴ - در خانمی G3P2Ab1 که در روز سوم پس از سزارین دچار تب و لرز شده است، پس از ۷۲ ساعت از مصرف آنتی بیوتیک هنوز درجه حرارت ۳۹ درجه می باشد. محتمل ترین تشخیص و اقدام بعدی چیست؟

(الف) فاشیت نکروزان و تجویز آنتی بیوتیک وسیع الطیف

(ب) آندومتریت و کشت خون

(ج) ترومبو فلپیت لگنی و سی تی اسکن لگن

(د) ترومبو فلپیت لگنی، تجویز فوری هپارین همراه با تجویز آنتی بیوتیک

۵۵ - در صورت تجویز مشتقات ارگوت جهت پیشگیری از خونریزی بعد از زایمان (PPH) در چه مواردی باید احتیاط نمود؟

(الف) زائویی که برای کنترل PPH همزمان میزوپروستول مصرف می کند.

(ب) زائویی که کربوپرست ترومتمامین مصرف می کند.

(ج) مادر مبتلا به HIV که داروی مهار کننده پروتئاز مصرف می کند.

(د) مادر مبتلا به اختلال انعقادی که داروی ضد انعقاد مصرف می کند.

۵۶ - کدام گزینه در رابطه با دیس منوره اولیه صحیح می باشد؟

(الف) معمولاً سال ها بعد از شروع منارک ظاهر می شود.

(ب) به علت مقادیر زیاد پروستانوئیدهای مترشحه از آندومتریوم است.

(ج) افت پروژسترون در انتهای فاز لوثنال با مهار عملکرد پروستاگلاندین منجر به درد می شود.

(د) OCP در دختران مجرد با دیس منوره مقاوم به NSAID توصیه نمی شود.

۵۷ - زوجی که ۶ ماه پیش ازدواج کرده اند با نگرانی از ناباروری مراجعه کرده اند. خانم ۳۷ ساله می باشد. کدام گزینه درباره احتمال ناباروری زوجین غلط است؟

(الف) نیازی به ارزیابی ناباروری نمی باشد تا یکسال فرصت دارند.

(ب) در صورت شمارش اسپرم کمتر از دو میلیون ICSI اندیکاسیون دارد.

(ج) افزایش سن زن می تواند عاملی برای کاهش باروری باشد.

(د) ارزیابی پایه ناباروری با آنالیز مایع منی شروع شود.

۵۸ - خانم ۶۱ ساله که در سن ۴۸ سالگی یائسه شده است با شکایت لکه بینی در یک هفته گذشته مراجعه کرده است. کدام علت برای خونریزی وی محتمل تر است؟

- (الف) پولیپ آندومتر (ب) واژینیت آتروفیک
(ج) هایپرپلازی آندومتر (د) بدحیمی دهانه رحم

۵۹ - خانم ۲۳ ساله با شکایت از زخم‌های دردناک ناحیه ولو مراجعه کرده است. در معاینه چند زخم کوچک با حاشیه نامنظم دارد. لنف‌های ناحیه اینگواینال قابل لمس و حساس می‌باشد. تشخیص و درمان شما چیست؟

- (الف) زخم سفلیسی - پنی سیلین
(ب) شانکرویید - آزیتروموایسین
(ج) تبخار تناسلی - آسیکلولویر
(د) زگیل تناسلی - پودوفیلین

۶۰ - براساس توصیه‌های غربالگری سرطان پستان، استفاده از MRI در چه مواردی توصیه می‌شود؟

- (الف) در زنان پرخطر همراه با ماموگرافی سالیانه
(ب) در زنان پرخطر هر سه سال یکبار
(ج) در زنان با خطر متوسط به صورت سالیانه
(د) در زنان کم خطر هر ۱۰ سال یکبار

روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

۶۱ - بیماری اقدام به خودکشی کرده است اما اظهار می‌کند که اقدامش جدی نبوده است. درمانگر به وی می‌گوید: «کاری که کردید ممکن بود موجب مرگ شما شود و نشان می‌دهد که هم اکنون دچار ناراحتی شدیدی هستید و احتیاج به کمک دارید تا مجدداً به این اقدام دست نزنید».

درمانگر از کدامیک از فنون اختصاصی مصاحبه استفاده کرده است؟

- (الف) تسهیل (ب) تصريح
(ج) سکوت (د) رویارویی

۶۲ - در مورد مفهوم نوجوانی بهنجار کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) اکثریت نوجوانان دوره انطباق پذیری با تغییرات جسمانی، شناختی و هیجانی ندارند.
(ب) کودکانی که دچار مشکلات روانشناختی هستند خطر ابتلا به اختلالات روانپزشکی در دوره نوجوانی شان بالاست.
(ج) نیمی از نوجوانان بیزاری از خود و اختلال سلوک را تجربه می‌کنند.
(د) نوجوانانی که احساس می‌کنند گروه همسالان آنان را پذیرفته‌اند بیشتر غرق پرستش یک چهره مشهور می‌شوند.

۶۳ - دو کودک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و هر کدام بازی با اسباب بازی خود را دنبال می‌کنند. این کودکان چه نوع بازی را انجام می‌دهند؟

- (الف) وانمودی (ب) موازی
(ج) ارتباطی (د) مشترک

۶۴ - مطابق نظریه ماهлер، کودک بیست ماهه که در هنگام بازی از مادرش دور می‌شود و پس از مدتی برای اطمینان به سوی او بازمی‌گردد، در کدام مرحله از جدایی - تفرد قرار دارد؟

- (الف) تمایز (ب) تجربه
(ج) آشتی (د) مداومت شیء

۶۵ - مطابق نظریه اریکسون «هویت ایگو» در کدامیک از مراحل رشد روانی - اجتماعی کسب می‌شود؟

- (الف) کودکی (ب) نوجوانی
(ج) بزرگسالی (د) پیری

مجموعه مامایی «ب»

- ۶۶ - دختری پس از تجاوز جنسی، دچار بیخوابی و یأس شده است. او در طی شش ماه خاطرات حادثه را به صورت مکرر در خواب و بیداری یادآوری کرده و دچار تپش قلب و تعریق منی شود. کدامیک از اختلالات زیر برای او مطرح است؟
- (الف) پانیک (ج) استرس پس از سانحه (ب) افسردگی اساسی (د) اضطراب فراگیر
- ۶۷ - فردی در خانه سالم‌مندان، از صبح امروز به طور ناگهانی، پرستار خود را نمی‌شناسد، کلمات را به خوبی بیان نمی‌کند و نمی‌داند که در کدام مکان قرار گرفته است. کدامیک از اختلالات شناختی برای اوی مطرح است؟
- (الف) دلیریوم (ب) دمانس (ج) نسیان پیش گستر (د) نسیان پس گستر
- ۶۸ - نوجوانی ۱۶ ساله به طور مکرر دزدی می‌کند. از مدرسه فرار می‌کند و با دعواهای مکرر به پلیس ارجاع داده می‌شود. برای اوی کدامیک از اختلالات مطرح است؟
- (الف) نافرمانی مقابله جویانه (ب) سلوک (ج) تجزیه ای (د) تبدیلی
- ۶۹ - کودکی ۸ ساله که دچار تکانشگری بوده، دائم وول می‌خورد و توانایی یک جاماندن حتی برای چند دقیقه را ندارد و نمی‌تواند کارهایی که نیاز به دقت دارد را ادامه دهد و هم در منزل و محل تحصیل با اوی مشکل دارند. احتمال ابتلا به کدام اختلال در اوی بیشتر است؟
- (الف) سلوک (ب) نافرمانی مقابله جویانه (ج) کم توجهی بیش فعالی (د) حرکتی - تیک
- ۷۰ - در کدامیک از اختلالات، ناراحتی مداوم در مورد جنسیت فرد و همانندسازی قوی با جنس مخالف وجود دارد؟
- (الف) هویت جنسی (ب) انحراف جنسی (ج) عملکرد جنسی (د) تبدیلی
- ۷۱ - «انقباضات موزون عضلات تناسلی لگن» در کدامیک از مراحل چرخه پاسخ فیزیولوژیک جنسی زنان ایجاد می‌شود؟
- (الف) میل جنسی (ب) برانگیختگی (ج) ارگاسم (د) فرونژینی
- ۷۲ - نوجوانی با ژنتیک XX، کلیتوریس بزرگ، لبهای فرج به هم چسبیده و هیرسوتیسم دارد. کدامیک از اختلالات بین جنسی برای اوی مطرح است؟
- (الف) سندروم کلاین فلتر (ب) سندروم آدرنوژنیتال (ج) دوجنسیتی واقعی (د) دوجنسیتی کاذب
- ۷۳ - افسردگی دوره یائسگی، به کدامیک از عوامل زیر نسبت داده می‌شود؟
- (الف) سندروم آشیانه خالی (ب) توقف تخمک گذاری (ج) آتروفی واژن (د) اختلالات شناختی
- ۷۴ - خانمی در ویزیت شش هفته پس از زایمان اظهار می‌کند که سه روز پس از تولد فرزندش، دچار غمگینی و عدم احساس لذت از وظایف مادری شده است که بعد از چند روز علائم او رفع شده است. کدامیک از موارد زیر برای اوی مطرح می‌شود؟
- (الف) اندوه بچه (ب) افسردگی پس از زایمان (ج) روان پریشی پس از زایمان (د) اختلال دوقطبی

- ۷۵ - بیماری «نژدیک به مرگ» در گفتگو با خدا می گوید: «من قول می دهم که اگر بهبود یابم، فرد خوب و مفیدی شوم». این فرد در کدامیک از مراحل مرگ کوپلر-راس قرار دارند؟
- (الف) خشم (ب) افسردگی (ج) شوک و انکار (د) چانه زنی
- ۷۶ - فرد قربانی تجاوز جنسی بلافضله واکسیناسیون هپاتیت B انجام داده است، زمان بعدی واکسیناسیون او کدامیک از موارد زیر است؟
- (الف) ۱ ماه (ب) ۲ ماه (ج) ۶ ماه (د) ۳ ماه
- ۷۷ - در زنان میانسال مبتلا به وستیبولا دینیا انگیخته شده، کدامیک از موارد زیر شایع تر است؟
- (الف) فیبرومیالژی (ب) دیسمنوره (ج) سندروم روده تحریک پذیر (د) سیستیت
- ۷۸ - در کدام تیپ قطع عضو ژنیتال زنانه، لبیامینور برداشته می شود؟
- (الف) ۱ (ب) ۲ (ج) ۳ (د) ۴
- ۷۹ - در کدام مرحله از مدل مشاوره PLISSIT، فیزیولوژی و رفتار جنسی توضیح داده می شود؟
- (الف) ۱ (ب) ۲ (ج) ۳ (د) ۴
- ۸۰ - در کدام تیپ از تجاوز کننده های جنسی، تجاوزگر می خواهد قربانی را کنترل کند؟
- (الف) فرصت طلب (ب) خشمگین (ج) قدرتی (د) سادیستیک

بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامائی

- ۸۱ - خانم باردار مبتلا به دیابت بارداری، ۳۲ ساله و G2 در سن بارداری ۲۸ هفته مراجعه کرده است. محتمل ترین پیامد بارداری در این خانم کدام است؟
- (الف) مرده زایی (ب) تولد زودرس (ج) تولد زودمن (د) ماکروزوومی
- ۸۲ - کدامیک از حجم ها و ظرفیت های تنفسی در زنان باردار کاهش می یابد؟
- (الف) ظرفیت حیاتی دمی (ب) حجم جاری (ج) تهویه لحظه ای (د) حجم ذخیره ای بازدمی
- ۸۳ - مصرف کدامیک از ترکیبات ضد فشار خون در سه ماهه دوم و سوم بارداری منجر به هیپوکالواریا و اختلال کلیه در جنین می شود؟
- (الف) عوامل بلوك کننده کانال کلسیم (ب) مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ج) واژودیلاتورها (د) دیورتیک ها



مجموعه مامایی «ب»

- ۸۴ - کدامیک از گزینه های زیر درباره پسوریازیس ژنرالیزه بارداری صدق می کند؟
 الف) معمولاً با خارش پایدار همراه است.
 ب) ضایعات ابتدا چین های بدن را درگیر می کند.
 ج) توسط پوستول های عفونی احاطه می شود.
 د) بیماری معمولاً بعد از زایمان ادامه می یابد.
- ۸۵ - کدامیک از علائم زیر می تواند در زنان مبتلا به سندروم شیهان دیده شود؟
 د) هیپرگلیسمی ب) هیپوتانسیون پایدار ج) برادیکاردی
- ۸۶ - در خانم باردار با تشخیص سرطان پستان، کدامیک از اقدامات درمانی، به بعد از زایمان موکول می گردد؟
 الف) ایمونوتراپی ب) جراحی ج) شیمی درمانی د) رادیوتراپی
- ۸۷ - براساس نتایج مطالعات، کدامیک از موارد زیر همراه با پرکاری پاراتیروئید مشاهده نمی شود؟
 الف) مرده زایی ب) تتانی نوزاد ج) وزن بالای موقع تولد د) وزن پایین موقع تولد
- ۸۸ - متداول ترین درمان برای پرکاری تیروئید زنان باردار چیست؟
 الف) متی مازول ب) پروپیل تیواوراسیل ج) تیروئیدکتومی ساب توتال د) ید رادیواکتیو
- ۸۹ - براساس طبقه بندی خطر WHO برای بیماری های قلبی، عروقی و بارداری، در چه مواردی خطر مرگ و میر مادران بسیار بالا است و ختم بارداری توصیه می شود؟
 الف) پیوند قلب ب) افزایش فشارخون شریانی ریوی ج) بیماری های قلبی سیانوتیک د) کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک
- ۹۰ - کدامیک از انواع هپاتیت های زیر همراه و یا متعاقب هپاتیت B ایجاد می شود؟
 E (د) D (ج) C (ب) A (الف)
- ۹۱ - خانم باردار ۳۴ ساله G2 در هفته ۲۸ بارداری با نارسایی کلیه مراجعه کرده است. چه نکاتی در درمان وی صحیح می باشد؟
 الف) شروع دیالیز با کراتی نین ۵ تا ۷ میلی گرم در دسی لیتر
 ب) انجام مرتب دیالیز هریک روز در میان
 ج) تجویز روتین مولتی ویتامین
 د) درمان آنمی مزمن با دوز بالای آهن
- ۹۲ - در مصرف کدامیک از داروهای ضد صرع در بارداری شناس نا亨نچاری جنینی بیشتر افزایش می یابد؟
 د) لاموتربیزین ب) فنی توئین ج) فنوباربیتال الف) والپروات



۹۳ - خانم باردار دیابتی با دردهای زایمانی در هفته ۳۸ بارداری مراجعه کرده است. کدامیک از اقدامات زیر حین **labor** برای وی توصیه می‌گردد؟

- (الف) سوم قندی و انسولین NPH
- (ب) سرم نمکی و انسولین کریستال
- (ج) سرم نمکی و انسولین NPH
- (د) سرم قندی و انسولین کریستال

۹۴ - وضعیت هموگلوبین در بیماران مبتلا به بتاکالاسمی مینور چگونه است؟

- (الف) هموگلوبین A₂ کمتر از ۳/۵٪
- (ب) هموگلوبین A₂ بیشتر از ۳/۵٪
- (ج) هموگلوبین F کمتر از ۰/۲٪
- (د) هموگلوبین H کمتر از ۰/۲٪

۹۵ - خانمی در هفته ۳۲ بارداری فریتین L / ۱۲ g / dL و هموگلوبین g/dL ۷/۶ داشته است. چه توصیه‌ای برای وی دارد؟

- (الف) روزانه ۲ قرص آهن ۳۰-۶۰ میلی گرم به مدت یک ماه و بررسی هموگلوبین یک هفته بعد
- (ب) روزانه ۲۰۰ میلی گرم آهن و بررسی هموگلوبین یک ماه بعد
- (ج) روزانه دو قرص آهن ۳۰-۶۰ میلی گرم تا پایان بارداری
- (د) روزانه یک قرص آهن ۳۰-۶۰ میلی گرم تا پایان بارداری

۹۶ - خانمی در اولین ویزیت بارداری قند ناشتای dl ۹۸ mg/dl داشته و در هفته ۲۷ در بررسی با تست تحمل گلوکز، قند ناشتای وی dl ۱۱۴ mg/dl و یک ساعت بعد dl ۱۷۸ mg/dl گزارش شده است. کدام مراقبت را برای وی توصیه می‌کنید؟

- (الف) تکرار تست تحمل گلوکز یک هفته دیگر انجام شود.
- (ب) با تشخیص پره دیابت، ورزش و رژیم غذایی توصیه شود.
- (ج) با تشخیص دیابت بارداری، درمان شروع گردد.
- (د) مراقبت‌های روتین بارداری ادامه یابد.

۹۷ - خانمی با سن بارداری ۳۲ هفته دچار پیلونفریت حاد شده است. کدامیک از پیامدهای زیر در وی محتمل نیست؟

- (الف) شوک سپتیک
- (ب) زایمان زودرس
- (ج) نارسایی تنفسی
- (د) کم خونی مزمن

۹۸ - خانمی که مبتلا به آسم بوده و در طول بارداری کورتون دریافت کرده است با درد زایمان و دیلاتاسیون ۲-۳ سانتیمتر و افاسمان کم در سن حاملگی ۳۹ هفته بستری شده است. کدام گزینه درباره مراقبت‌های اتاق زایمان وی صحیح است؟

- (الف) استفاده از پروستاگلاندین E₁ و E₂ جهت آماده سازی سرویکس و القاء زایمان
- (ب) عدم نیاز به استرس دوز کورتیکواستروئید تا بعد از زایمان
- (ج) در صورت نیاز به سزارین، بی دردی اپیدورال خطرناک است.
- (د) بعد از زایمان مشتقات ارگوت ممنوعیتی ندارند.

۹۹ - خانم باردار ۳۴ هفته دچار ترومبوز ورید عمقی شده است. ترومبوز در کدام ورید محتمل تر است؟

- (د) تخدمان
- (ج) ساق پا
- (ب) ایلیاک
- (الف) ایلیو فمورال



- ۱۰۰ - کدام گزینه درباره خانم باردار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نادرست می باشد؟
- الف) کاهش میزان عود در بارداری
 - ب) تجویز ایمنوگلوبین وریدی در پیشگیری از عود نفاسی
 - ج) افزایش عفونت ادراری در حضور اختلال عملکرد مثانه
 - د) افزایش عود بعد از زایمان با شیردهی
- نوزادان و مراقبت‌های مربوطه**
- ۱۰۱ - در معاینه نوزاد قدر قطر قرنیه بیش از ۱ سانتیمتر به همراه فتوفوبي و اشک ریزش مشاهده می شود. چه تشخیصی مطرح است و چه اقدامی را توصیه می کنید؟
- الف) کاتاراکت - ارجاع به چشم پزشک
 - ب) گلوکوم مادرزادی - مشاوره فوری چشم پزشکی
 - ج) کنژکتیویت - تجویز اریترومایسین
 - د) یک هفته بعد مجددا بررسی شده و تصمیم گیری شود.
- ۱۰۲ - کدام گزینه در معاینه نوزاد، غیرطبیعی تلقی می شود و چه اقدامی لازم است؟
- الف) لمس کبد ۲ سانتیمتر پایین تراز لبه دندنه ها - سونوگرافی شکم
 - ب) ادم لوکالیزه یک اندام در نوزاد دختر - کاریوتایپ
 - ج) اکروسیانوز - بررسی وضعیت قلبی تنفسی
 - د) رنگ پریدگی نوزاد دیررس - بررسی آنمی نوزادی
- ۱۰۳ - میزان هموگلوبین خون بند ناف نوزاد ترمی برابر $14/1 \text{ g/dL}$ است. تشخیص شما چه می باشد؟
- الف) در محدوده طبیعی است.
 - ب) دچار کاهش فیزیولوژیک هموگلوبین است.
 - ج) کاهش تولید اریتروسیت دارد.
 - د) دچار خونریزی مزمن می باشد.
- ۱۰۴ - کدام گزینه از تظاهرات بالینی شدید پلتورا (Plethora) در نوزادان است؟
- الف) تحریک پذیری
 - ب) تاکی پنه
 - ج) هیپرتانسیون ریوی
 - د) سیانوز
- ۱۰۵ - مصرف کدامیک از داروهای زیر توسط مادر، در زمان شیردهی برای نوزاد احتمالاً بی خطر است؟
- الف) کلرامفینیکل
 - ب) متی مازول
 - ج) مترونیدازول
 - د) دیگوکسین
- ۱۰۶ - در صورت ابتلا مادر به مایکوپلاسمای همونیس کدامیک از موارد زیر به ترتیب پیامد نوزادی و راه انتقال می باشد؟
- الف) سپسیس - جفت
 - ب) سپسیس - صعود از سرویکس
 - ج) پنومونی - صعود از سرویکس
 - د) پنومونی - جفت
- ۱۰۷ - نوزادی دچار دیسترنس تنفسی است. صدای روده در قفسه سینه شنیده می شود. شکم قایقی شکل است. کدامیک از اختلالات زیر در وی محتمل است؟
- الف) گاستروشیزی
 - ب) فتق دیافراگم
 - ج) انسداد روده
 - د) فیستول تراکئو ایزو فاژیال

۱۰۸ - در نوزاد ترم لتارزیک، رفلکس های تاندونی هیپر اکتیو بوده، رفلکس مورو ضعیف است. مردمک ها دچار میوز (تنگ شدگی) بوده و حملات تشنجی وجود دارد. این نوزاد در کدامیک از مراحل آنسفالوباتی هپیوکسمیک - ایسکمیک قرار دارد. پیش آگهی آن چگونه است؟

- الف) مرحله ۲ با پیش آگهی بد
- ب) مرحله ۲ با پیش آگهی متغیر
- ج) مرحله ۳ با پیش آگهی بد
- د) مرحله ۳ با پیش آگهی متغیر

۱۰۹ - کدامیک از موارد زیر، نوزاد را با خطر بالاتری از وقوع سندروم آسپیراسیون مکونیوم مواجه می کند؟

- الف) هیپرتونی
- ب) تاکی کاردی
- ج) اسیدوز جنینی
- د) افزایش تلاش تنفسی

۱۱۰ - در صورتی که نوزاد ساکت و آرام باشد، معاینه نوزاد از کدام قسمت بدن باید آغاز شود؟

- الف) معاینه سر و گردن
- ب) لمس شکم
- ج) معاینه اندام ها
- د) بررسی رفلکس ها

۱۱۱ - همه گزینه ها جزء بیشترین عوامل بروز سندروم زجر تنفسی (RDS) نوزادان است، بجز:

- الف) سن بارداری بیشتر از ۳۷ هفته
- ب) زایمان سریع
- ج) حاملگی چند قلویی
- د) زایمان سزارین

۱۱۲ - از روز سوم بعد از تولد پاپول های کوچک سفید، حاوی ائوزینوفیل در زمینه اریتماتو، روی پوست نوزادی پدیدار گشته و به مدت یک هفته پا بر جا مانده است. کدامیک از موارد زیر مطرح است؟

- الف) اریتم توکسیکوم
- ب) ملانوز پوستی
- ج) موتلینگ
- د) همانزیوم کاورنوی

۱۱۳ - کدامیک از جملات زیر درخصوص مراقبت از بند ناف و پوست نوزاد صحیح است؟

- الف) پاک کردن خون از روی پوست نوزاد در فاصله کمی بعد از تولد احتمال عفونت را کاهش می دهد.
- ب) استفاده مداوم از کلرهگزین در نوزاد کم وزن توصیه می شود.
- ج) استفاده از پمادهای موضعی در نوزاد پره ترم، خطر سپسیس باکتریایی را کاهش می دهد.
- د) شستشوی بند ناف با آب گرم و صابون حتی پس از تثبیت درجه حرارت مجاز نیست.



۱۱۴ - نوزاد مادری که اعتیاد به مواد مخدر دارد در عرض ۳۴ ساعت بعد از تولد، دفع گاز و مدفوع نداشته در بررسی انجام شده، مشخص شد، توده‌ای در ناحیه آنورکتال نوزاد وجود دارد. تشخیص کدام است؟

- (الف) فیبروز سیستیک
- (ب) پلاگ مکونیوم
- (ج) مکونیوم ایلیوس
- (د) انتروکولیت نکروزان

۱۱۵ - کدام گزینه در مورد کاهش متوسط فاکتورهای II، VII، IX و X نوزادان ترم صحیح است؟

- (الف) بین ۱۰-۷ روز بعد از تولد رخ می‌دهد.
- (ب) در عرض ۳۰ روز به مقدار زمان تولد برمی‌گردد.
- (ج) DIC است که با تجویز ویتامین K بهبود می‌یابد.
- (د) گذرا است و با تجویز ویتامین K بهبود می‌یابد.

۱۱۶ - کدام گزینه جزء علائم و نشانه‌های سپسیس نوزادی است؟

- (الف) دمای پایدار
- (ب) پیوست
- (ج) افزایش پاسخ به تحریکات
- (د) خوب شیر نخوردن

۱۱۷ - در زمان اقدامات احیاء در نوزاد بدهال، بهترین روش برای گرم کردن نوزاد کدام است؟

- (الف) پوشاندن با پتو
- (ب) قرار دادن در انکوباتور
- (ج) تماس پوست به پوست با مادر
- (د) استفاده از منابع تابشی حرارت

۱۱۸ - در معاينه نوزاد پسری، آلت تناسلی کوچک و در بررسی پاراکلینیکی هیپربیلیروبینمی گزارش شده است. احتمال کدام مشکل قوی تر است؟


- (الف) هیپوتیروئیدی مادرزادی
- (ب) دوارفیسم هیپوفیزی
- (ج) هیپوپاراتیروئیدی گذرا
- (د) هیپوتیروکسینمی گذرا

۱۱۹ - کدام گزینه در مورد نوزادان مادران دیابتی صحیح است؟

- (الف) طی ۱-۳ روز اول زندگی، نوزاد معمولاً بی قرار است.
- (ب) حداقل کاهش غلظت گلوکز خون باید طی ۳-۶ ساعت ایجاد شود.
- (ج) کاهش گلوکز، به طور خود به خودی در عرض ۷-۱۰ ساعت بهبود می‌یابد
- (د) طی ۱-۳ هفته اول زندگی، نوزاد معمولاً تحریک پذیر است.

۱۲۰ - کدام گزینه از علل دفورماتیون‌های نوزادی (تغییر شکل) از نوع خارجی است؟

- (الف) اختلالات اولیه عصبی
- (ب) الیگوهیدرآمنیوس ناشی از تقایص مادرزادی کلیه
- (ج) الیگوهیدرآمنیوس ناشی از نشت مزمن مایع آمنیوتیک
- (د) اختلالات اولیه عضلانی



زبان عمومی

Part One: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each Passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d).
 Base your answers on the information given in the passages only.

Passage 1

A conservative estimate is that there are at least 300000 people in Britain with alcohol-related problems. A recent survey on drinking in England and Wales found that 5% of men and 2% of women suffered from alcohol-related problems. People with serious drinking problems have an increased risk of dying which is between two and three times greater than that of the general population at the same age and sex.

Approximately one in five male admissions to acute medical wards directly or indirectly die due to alcohol. Between 30 and 40% of casualty attenders have blood alcohol concentrations above the present legal limit for driving. Up to one in five seemingly healthy men attending health screening programs are found to have biochemical evidence of heavy alcohol consumption, though they are a selected population coming mainly from the upper social classes. Of 2000 patients on the practice list of the average general practitioner, about 100 will be heavy drinkers, 40 will be problem drinkers, and 10 will be physically dependent on alcohol.

121 – The writer seems to be..... alcohol-related problems in Britain.

- a) content with
- b) a victim of
- c) confused by
- d) worried about

122 – The writer's report on drinking problems in Britain.....

- a) is based on evidence
- b) uses imaginary figures
- c) is his personal judgment and estimate
- d) describes the British society's health status

123 – The writer refers to admissions to medical wards and casualty departments as drinking problems.

- a) the main risks of
- b) some examples of
- c) the best place for
- d) ways of treating

124 – Alcohol-related problems.....

- a) affect men and women similarly
- b) may have some beneficial effects on women
- c) hardly affect women with heavy alcohol consumption
- d) have involved males more than females



125 – Statistically speaking, physically dependent drinkers than heavy or problem drinkers.

- a) die sooner
- b) are fewer in number
- c) face fewer health risks
- d) cause fewer social harms

Passage 2

Although psychiatric symptoms can be clearly bizarre, many are recognizable as part of normal experience. The situation is identical to the assessment of pain: a doctor cannot experience a patient's pain nor measure it objectively but is still able to assess its significance. A pattern can be built up by comparing the patient's reported pain – its intensity, quality and location – with observation of the patient's behavior and disability associated with it. Similarly, patient's complaints of 'feeling depressed' may be linked to specific events in their life, to a preventive sense of low self-esteem, or to somatic features such as disturbed sleep and diurnal variation in mood.

Another myth is that the vagueness of psychiatric features make diagnosis impossible. In fact, psychiatric diagnoses based on current classification systems are highly reliable. It is true that there are no pathognomonic signs in psychiatry – that is, most psychiatric signs in isolation have low predictive validity, as similar features may occur in several different disorders. It is the pattern of symptoms and signs that is paramount.

126 – The writer believes that psychiatric symptoms.....

- a) can be objectively quantified
- b) may originate from patterns of pain
- c) are too complex to interpret and diagnose
- d) may follow a specific pattern

127 – It is understood form the passage that psychiatric symptoms are

- a) subjective
- b) quantified
- c) difficult to detect
- d) reliably curable

128 – Psychiatric symptoms and pain are similar in that both

- a) present more or less the same pattern
- b) can be followed to create a pattern
- c) result from comparable sources
- d) lead to identical diagnoses

129 – What does "it" (line 5) refers to ?

- a) intensity
- b) behavior
- c) observation
- d) disability

130 – The writer the idea that mental disorders are difficult to diagnose.

- a) clearly questions
- b) implicitly supports
- c) takes a neutral view on
- d) takes a biased view regarding



Passage 3

The art of medicine deals with the whole gamut of doctor-patient relationship. Most patients think that high-tech medicine can do wonders for suffering humanity. While it can do a lot in social situations like emergency care, in all other areas, the art of medicine rules the roost. Even in an emergency, human compassion can do a lot to assist machines, which can appear quite frightening to the critically ill. In the outdoor, indoor, operation theatre, labor room, during various investigations or in any survey of the community, everywhere, the doctor-patient relationship requires compassion, a caring attitude from the doctors, besides the communication skills. A surgeon, physician or any health care provider needs to be a good human being. A knife only cuts or a drug assists, along with the availability of best possible technology, drugs or other logistics. The vital forces of the body and the intense desire to live, or the positive attitude of the patient are what really count. Also other major factors such as concern, sympathy, compassion, assurance and other humane qualities of the doctor, which can be termed the art of medicine, are of much importance in practicing medicine. Diagnosing disease and choosing the best treatment certainly requires scientific knowledge and technical skills in health care professionals. But only this much won't do.

A medicine that cares or cures, helps or heals has an even greater consequence for humanity than that of merely mending, tending, patching preventing the various ailments that are the result of being alive.

131 – According to the passage, the art of medicine is the way doctors

- a) behave toward patients
- b) use modern technology
- c) handle available logistics
- d) diagnose and treat diseases

132 – The passage describes a contrast between

- a) medical expertise and technology
- b) doctor and patient attitudes
- c) ailments and health care
- d) the art and science of medicine

133 – In line 2, “it” refers to

- a) the art of medicine
- b) doctor-patient relationship
- c) high tech medicine
- d) the whole gamut

134 – The author rejects the idea that medical knowledge and skill is

- a) vital if complemented by sympathy
- b) the ultimate means of diagnosis and treatment
- c) an essential part of emergency care
- d) part of any health care provider's career

